


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
65/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
65/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
65/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
65/A

65/A










70014

GEORGII
AGRICOLAE
DE ANIMANTIBVS
subterraneis
Liber.



M▷D▷XLIX▷

GEORGE

AGRICOLAE


DE

IN

LIBRIS



PRO



MDCLXIX

A
den
pub
re
tia
don
tifer
ban
tous
dau
ren
en
re
da
nu
pro
res
ras

GEORGIVS

AGRICOLA GEORGIO

Fabricio S.P.D.

Q Vanquam duos libros de stirpibus scripsit Aristoteles, tamen ipsius Theophrastum discipulum non deterruit, quo minus suam de ipsiusdem stirpibus sententiam multis libris explicaret. Nec ipse Theophrastus tanta scientia tantaque copia studium Dioscoridis ardoremque restinxit: sed etiam is posteritati seruiens quarundam arborum ac herbarum figuras & vires, longo atque multo usu perceptas, literis memorięque mandauit. Male enim se habuissent studia, si ætate inferioribus ad ea quæ à maioribus erant inuenta, nihil addere licuisset, certe si Græci hanc legem iniquam quondam accepissent, nulla ars, nulla scientia, nulla disciplina potuisset perfici. Quapropter etsi Aristoteles libros complures edidit, in quibus animantium naturas, partes, ortus ratione & uia est persecutus

cutus: tamē philosophiæ deditos auoca-
re nec uoluit, nec debuit, à studio tū per-
quirendi posterisq; prodēdi naturas ea-
rum animantium, de quibus parum aut
nihil scripsit: tum tractandi locos, quos
in ijs libris nō satis expressit. Itaq; etiam
apud Græcos Oppianus scripsit de pīsci-
bus, de animantium natura Porphyrius
& Aelianus: apud Latinos item de pīsci-
bus Ouidius, de omnibus ferē animan-
tibus Plinius. Quos scriptores ego se-
cutus cum res subterraneas, quæ anima
carent, exposuissem pluribus libris, ut
rationem institutam, quoad fieri posset,
absoluerem, animantes etiam descripsi
subterraneas. nec eas modo quæ perpe-
tuo ferē uersantur in terra, sed eas quoq;
quæ certis anni temporibus in eadem so-
lent latēre. Quo sanē modo et bestiarum
quarūdam formas Aristoteli & alijs uel
incognitas, uel parum expressas, & illi-
us locum de animantibus, quæ hybernis
se condunt mensibus, uolui latius expli-
care. Hunc librum si probauero tibi,
qui Latinis & Græcis literis in primis e-
rudi

BRICIVM EPIST.

5

ruditus, animantium naturas scrutaris,
& iam multarum cognitionem cepisti,
eū facilius, ut spero, ceteris qui itē rerum
occultarū studio delectantur, probabo.

Vale Kempnicij, III Idus Aug.

Anno M. D. XLVIII

a 3

HI SVNT SCRIPTORES, QVO-
rum inuentis usus sum, & qui me
ad hanc experientiam
excitarunt.

Aelianus	Lucanus
Albertus	
Alexāder Aphro- dientis	Martialis
Ammonius	Nicander
Aristoteles	
Aristophanes	Oppianus
Athenæus	Ouidius
Charisius	Plautus
Cicero	Plinius
Columella	Pfellus
Corn. Tacitus	
Dioscorides	Seneca
	Strabo
Galenus	Theophrastus
Homerus	
Horatius	Varro
	Virgilius
Iornandes	Xenophon

7

GEORGII AGRICOLAE DE ANIMANTIBVS
subterraneis Liber.



CORPVS subterraneum, ut res ipsa demonstrat, in animatum distribuitur, & inanimatum. quod autem animi expers est, rursus diuiditur in id quod sua sponte erumpit ex terra, & in id quod ex eadem effoditur. De altero inanimati genere dixi in quatuor libris de natura eorum quæ effluunt ex terra inscriptis, de altero in decem de natura fossilium: nunc de subterraneis animantibus dicam. Cum uerò genus animantium omne constet ex quatuor elementis, & corpus humidum ac siccum, id est aqua & terra, ad accipiendum apta sint, necesse est ea ipsa duo elementa animantium materiam esse. Ex quo rursus illud quadam naturæ necessitate consequitur, ut omne animal & in aqua uel terra gignatur, & in eis commoretur atque uita fruatur. Nam bestię uolucres,

etsi passim per aerem uolitant, tamen in terra, uel in stirpibus ex ea natis, uel in edificijs super ipsam collocatis, construnt nidos, & eis aut terra aut aqua cibos suppeditat. Vt enim uerum sit quod perhibent, aues luteas, raras illas, et nō adeo magnas, quarum pennas insignes, item luteas & splendentes, rex Turcarum in superiore capitis parte integumentis inuoluta gestat, in aere perpetuū uitæ cursum tenere, foeminam ouis quæ parit, super marem locatis incubare & pullos excludere, neutram uiuam unquam pedem terram attingere, quod fistulam habeant per corpus penetrantem, qua aerē transmittunt, tamen solo aere nec ali uidentur posse, nec augescere, sed his quibus uescuntur. Ac uerò etiam bestiola, quæ *πυρροί*, propterea quod in terreno isto igni gignuntur, à Græcis nominantur, terra & aqua non carent. gignuntur autem, ut Aristoteles scribit, in his Cypri fornacibus, in quibus lapis ærarius multos dies crematur: atq; magnis muscis paulo maiores sunt & subalatae. In igni ambulant & saliant, sed emoriuntur quam

quàm primū ab eo dimotæ fuerint. Animantium partim, tametsi latere soleant, non subeunt terræ rimas, nec foramina, nec speluncas: quæ in subterranearū numero non sunt. partim noctu, aut interdū subterraneas succedūt cauernas, partim certo anni tempore: quarū utræque eo ipso diei uel anni tempore subterraneæ sunt, atq; dici possunt. partim ferè perpetuo occulte in terra latēt: quæ subterraneæ & semper sunt, & proprie dicuntur. Vt autem res expressior & illustrior fiat, paulo altius ordiar. Quoniam animātes omnes natura mutationes temporum sentiunt, pleræq; frigoris aut caloris uitandī causa uel regionē locūmue mutant: uel ingrediuntur in domicilia, aut arbores exesas & excauatas: uel subeunt terram. Earum autem quæ regionem mutant, aliæ semel egressæ nunquā reuertuntur, alię reuertuntur, nunquam redire solent rationis participes, hoc est homines. Etenim hi non modo frigoris aut caloris uitandī causa alibi sedē collocant, uerum etiam ex regionibus macris & nihil ferentibus migrant in opimas & fertiles

fertiles: uel cum tanta multitudo fuerit
orta, quantam non satis cōmode alit re-
gio, partim aliò ad habitandū eunt. Quo
fanè modo alia ora parsq̃ terrarū onus,
quo premitur, in alia sæpe deponit, qui-
bus de causis Scādia, peninsularum om-
nium maxima, olim magnā Gothorum
copiam unā cum coniugibus & liberis
effudit in Sarmatiam & Daciam. Cim-
bros uerò & Teutones ex ultimis Gal-
liæ Belgicæ oris, in quas è Germania cō-
migrarunt, maris inundationes exege-
runt Et eadem ac terræ motus atq̃ eru-
ptiones ignium & aquarū calidarum ef-
fusiones ex Aenaria colonos, quos Hie-
ro tyrānus Syracusanus eò miserat. Atq̃
his ferè de causis gentes aut uictæ ab his
quæ migrarunt, expelluntur & eñciunt̃
ex proprijs sedib. ac possessionibus, ui-
cissimq̃ etiā ipsæ in alienas irruūt & eas
occupant: aut subactæ & bello domitæ
uictricibus seruiūt: aut tam uictæ quàm
uictrices communi conditione liberta-
tis eandem regionē obtinent. Simili mo-
do animātes rationis expertes, maxime
uolucres, ex regionibus in quibus & na-
tæ

te sunt & uiuere consueuerūt, nunquam
redituræ in exterarum se conferunt: etsi ra-
rius. Quo pacto ab hinc annos sex locu-
stæ, diræ herbarum, leguminum, segetū,
stirpium, quas uastant, pestes, gregatim
inuolarunt in Pannonias, in Daciam, in
ueterem regionem Marcomannorum,
Lygiorumq;: ut quondam etiā sæpe ex
Africa in alias Europæ oras. Quin ut in-
terdum unicus homo in longinquas re-
giones abit, nec redit unquam, ita unum
solum animal. quo modo annos abhinc
propè uiginti in Norico captum est ani-
mal canis uillis uestitum: cuius, ut cephi
Aethiopici, prioribus pedibus similitu-
do erat cum humanis manibus: postero-
ribus cum humanis pedibus. Et Alberti
cognomento Magni temporibus in Sla-
uorum syluis comprehensæ sunt animan-
tes duæ mas & foemina, quarum pedes
priores item erāt similes manibus huma-
nis: posteriores pedibus humanis. eas ue-
rò ipse putauit esse in simiarum genere.
Ac ibim Aegyptiam in Alpibus à Mar-
co Egnatio Caluino præfecto uisam Pli-
nius memoriæ prodidit. Aquilam quoq;
Nors

Northusæ in Toringia, quum ibi con-
nuisset mortuam scimus. Hoc etiam an-
no, qui est octauus & uicesimus imperij
Caroli quinti, Ianus quidā Dincelspy-
hensis aquilam profligatam occidit, et
quasi donum senatui attulit. quæ aquila
in eum in equo sedentem, pridie Epipha-
niæ prope Rotelin oppidū impetu tam
uiolento inuolauit, ut non procul abes-
set à periculo uitæ. Eodem modo uerisi-
mile est aliquos etiam pisces, cum semel
reliquerunt mare, in fluuios, qui per lon-
ginquas regiones fluunt ingredi, & nun-
quam in idem redire. Haftenus de
generibus animantium dixi, quæ in re-
gionem è qua egressæ sunt nō reuertun-
tur: nunc dicam de his quæ reuerti solēt.
quæ & eadē sunt, & eadem ferè de cau-
sa, caloris scilicet uel frigoris uitādi, à re-
gione, cuius incolæ sunt, semigrant: &
quidem estate in locis frigidis, hyeme in
tepidis morantur. Etenim homines qui
ualetudini dant operam, ut tueri se pos-
sint à calore, in æstiuis sunt: ut à frigore,
in hybernis, qui mos in primis fuit Ro-
manis. Atq; etiam reges & domini mul-
tarum

tarum gentium æstate in alias terras abeunt, in alias hyeme. nam reges Persarū olim hyberno tempore Babylone degebant, uerno Susis, æstiuo in Ecbatanis. Eodem modo bestię uolucres & aquatiles solum mutant & secedunt: quarum alię in his ipsis regionibus et locis, in quibus æuum agere consueuerunt, refrigerationem in æstate, in hyeme teporem solent persequi: alię in longinquis & ultimis. Ac ferē uolant, natant, eunt ad habitandum in locis, in quibus aer ita sit temperatus, ut cibos ferat uel suggerat. quorum nascendi facultatem eis adimit terra, quando frigore obrigit, uel calore exaruit: aqua eos non suppeditat, quando conglaciauit. Aues enim quædā æstiuo tempore in syluis, hyemali ad horrea & tecta plerunq; commorantur: ut pica, cornix, lurida, quam ἰκτόρου Græci, Latini uocāt galgulum. quædam cum æstate eū agant in syluis, hyeme demigrant in finitimos locos apricos, montium recessus secutæ: sicuti uultures, milui, sturmi, turdi, merule, palumbes, upupe. aquatiles etiam uolucres temporibus hyber-

nis

nis se conferunt ad lacus & fluuios, in austrari partibus sitos, qui frigore non congelant: aut ad aliquam fluminum partem, cui aqua non congelat: ut ardeolæ, mergi, corui aquatici, onocrotali, fulicæ, anates immanfuetæ, querquedulæ: quedam ab ultimis quasi terris discedunt in ultimas: ueluti grues. Etenim, quod Aristoteles tradit, ex Scythiæ campis proficiuntur ad paludes Aegypto superiores, unde Nilus profluit. Abeunt etiam longius olores, ciconiæ, immanfueti anseres. Pauce uero aues hyeme in syluis manent, ut tetraones, attagenes: minus multæ in agris, quarum in numero sunt perdices. Item piscium alij, ut uitare possint solis calores, æstate de littore abeunt in altum: & contrà, ut consecretari queant teporem hyeme ex alto, in quo se merferant, emergunt, ac in littore uersantur: ueluti delphini: alij ex mari ingrediuntur in mare, ut thynni hyberno tempore ex Ponto in magnum mare: & contrà uerno ex magno mari in Pontum. Alij eodem tempore in fluuios, ut salmones, esoces, thynni, sturiones. Atque hæ animantes

tes subterraneæ dici non possunt: ut nec
ullæ aliæ quæ terræ cauernas non succe-
dunt: etiam si frigoris uitædi causa hyber-
nis mensibus, caloris æstiuus occultetur
& lateât. quales sunt in hominum gene-
re qui multum frigidas aut calidas regio-
nes habitant. nam qui illas hyberno tem-
pore, qui has æstiuo in domibus latet, in
quadrupedum genere erinacei: hyeme
enim se cōdunt in cauas arbores, in quas
autumno poma comportarunt. Simili-
ter glires & mures Pontici, ac serpentes
quidam se condunt in cauas arbores: sed
hi ipsi maxima ex parte, ut postea dicā,
saxorum cauernas succedunt. Quædam
etiam blattæ & aselli rimis parietum &
domorum latebris occultantur. Formi-
cæ quoq; conduntur in aceruīs, in quibus
congerendis uere & æstate multum ope-
ræ & laboris consumpserunt. Apes i-
tem hyeme ingrediuntur in alueos: cra-
brones syluestres in cauernas & quosdā
quasi nidulos arborum: uespæ in earun-
dem domorumue nidulos, quos æstate
construxerūt. Similiter hyeme latent in
cauis arboribus non pauca uolucres, ut
cuculus

cuculus, picus, coruus, cuius caput rubra macula insigne, qui propterea *ωυπερ-
γονος* à Græcis nominatur, upupæ quæ-
dam. At hirundines tam domesticæ quæ
agrestes in loca uicina quæ sunt tepidio-
ra secedunt: quæ si defuerint eis, se in an-
gustis montium locis cōdunt, in quibus
aliquando etiam sturni, palumbes, turtu-
res, merulæ, turdi, alaudæ, upupæ latere
consueuerunt. Siue autem in arboribus
siue in montib. latuerint, ea de causa uer-
no tempore deplumes solent conspici.
Satis multa, & fortassis plura quàm insti-
tuta ratio postulabat, dixi de his animan-
tibus quæ caloris frigorisue uitandæ cau-
sa non subeunt terræ neque rimas neque fo-
ramina, neque speluncas. Quanquam quæ
dicta sunt, ita apte natura cum his quæ se-
quuntur coherent, ut distracta uix possint
satis cōmode explicari. Igitur animanti-
um, quarum gratia potissimum hūc scribēdi
laborem suscepi, tria sunt genera. Quæ-
dam enim uel noctu uel interdiu subeunt
terræ cauernas, atque in eis delitescunt, dor-
miuntue: sed pleræque omnes etiam hye-
me egrediuntur ad pastum capeſcendum.
quædam

quædam certo anni tēpore subterraneas
succedunt cauernas, & in eis graui som-
no pressæ aliquot menses consumunt.
Quædam ferè perpetuo occulte in terra
latent. primi generis non solum terrenæ
sunt, sed etiam uolucres. uerum terrenas
primò persequar. Earum autē in nume-
ro habētur homines cauernas succeden-
tes, qui ex eo nominantur Troglodytæ.
quorum alij eas cauernas subeunt calo-
ris uitandī causa, ut qui in Africa habi-
tant ad mare rubrum: alij frigoris, ut qui
in Asia post Caucasum montē incolunt
planiciem septētriones uersus sitam: &
syluestres homines, qui in Scandiæ re-
gione Scricfinnia noctu nautis infesti
sunt: quos ij rogis ardentibus abigunt.
In Armenia etiam maiori, ut Xenophō
optimus author scribit, sunt domus sub-
terraneæ, quarum ostium putei instar an-
gustum est, inferior pars lata: aditus iu-
mentis sunt fossiles, homines descendūt
gradibus. Quin in Tenedo insula pisca-
tores hodie rupium speluncis pro domi-
bus utūtur: ut quondam Sybilla Cumæa
antro illo ad Auernum lacum tam musi

b

uo

uo opere insigni ꝓ uaticinationibus nobili. Et Circe, mulier cantionibus clara, habitauit ὧν ἀπὸ τοῦ γλαφυροῦσι, ut Homerus canit. In Sedunis etiam in tractu Sittenſi ad Bremisam pagum ex rupe excisa sine ullis tignis & trabibus ligneis formatum est integrum cœnobium, hoc est templum, cubicula, conclaue, culina, cella uinaria. Similiter in altis mōtibus conspiciuntur arces subterraneæ: ut quæ in Saxonia inter Blancheburgum & Halberſtadum est: quæ in Toringia inter Vimariam et Blanchenhainam prope Mellingum pagum: illius nomen est Reineſteinum uetus, huius Puſhardum: atque ea distat à Vimaria quatuor milib. passuum. utraq; ab habitatoribus nunc deserta est & uacua: utraq; habet in saxo incisa hypocausta, conclauia, scamna, stabula, præsepia, ianuas, fenestras: Saxonica uerò etiam templum, supra quod incolæ exstruxerunt speculam, quæ sola subiecta fuit sub aspectū. Hoc templum testudinis figura, & pila mediâ rotunda insigne est: cætera omnia sunt quadrata. Ipse mons Saxonicus præceps est ex omni

in omni parte, præter eam qua ascenditur. in cuius planicie excelsus collis clementer affurgit, qui qua parte planiciem spectat fossa satis alta & lata circumdatur. ex huius collis saxo arenario, nonnihil rubro, exciso formata est arx illa, cui multæ & magnæ fenestræ. quin in pede ipsius montis cellæ sunt subterraneæ cum equorum item stabulis. Vtræque arx hoc enigma peperit usitatum Saxonibus & Toringis,

Dic quibus in terris arx alto condita monte

Mille ubi per tectum possunt errare balantes.

Hoensteini etiam, quæ arx est Misenæ trans Albim, equorum stabula in saxo incisa sunt. Et Prenestinæ fossæ subterraneæ literis celebrantur, in quarum una Caius Marius obsessus extinctusque occidit. Græcas quoque mulieres, quæ meretricium quæstum faciebant publice, in cellulis subterraneis habitasse ex comicorum scriptis apparet: à quibus χαμαί-
τυπῆα nominantur. Et ganeū ἀπὸ Πυλῆς, quod esset in terra, dictum putat Terentij, interpretes. Tales etiam cellæ Romæ
b 2 fuerunt

fuerunt, & frequētiore quidem sub cir-
co maximo, qua pertinet ad naumachi-
am, & in uico Suburano, & Summænia-
no atq; Thusco. In maritimis quoq; Ger-
manię quibusdā urbibus, sicut in Prussis
Dantisci, & in Saxonibus Lubeci, bona
uulgi pars sub terra habitat in testudini-
bus, super quas exstructæ sunt magnifi-
cæ domus, quæ à dominis incoluntur.

Eodem modo cuniculus, uulpes, lutra,
meles, & fortassis aliæ quædam bestię
subeunt cauernas, sed egrediūtur ad pa-
stum capescendum etiam hyberno tem-
pore. Ac cuniculus quidem multos fo-
dit specus, & in colles terrenos agit cuni-
culos: ex qua re nomen inuenit. Mane
& uesperī egreditur, reliquo tempore fe-
rè latet. Aliquos autē specus operit pul-
uere, ne deprehendātur. Sed eum uiuer-
ra atque parui quidam canes, quibus est
ad inuestigandum sagacitas narium, in
specus & cuniculos immissi, aut liquor
feruens in eosdem infusus, fugatum &
exturbatum pellunt in retia, quibus ca-
pitur. Cuniculis autem non unus est co-
lor; uel enim in cinereo fuscus, uel lepo-
ri

ri nonnihil similis, uel maculosus: quo
modo candidi nigris uel rutilis maculis
stellantur. Vulpes uerò in primis ad
fraudem callida, non tam ipsa fodit spe-
cus, quàm ab alijs animantibus effossos
occupat. Et melem à specu prærepto,
quia eius os stercoreibus inquinat, foeto-
re abigit. Venatur lepores, cuniculos,
mures, gallinas, aues, pisciculos. Dolose
autem agit omnia. Etenim sæpe lepores
& cuniculos, dum simulat se cum eis col-
ludere uelle, capit incautos: muribus, ut
feles, insidiari solet. gallinas noctu, clam
ingressa in casas,prehendit & asportat.
aues, dum insidiosè se fingit mortuam,
ad ipsam aduolantes, captas necat & de-
uorat. Cauda, quã huic animali magnam
& uillis densam natura donauit, à ripis
in flumen demissa, pisciculos in eam in-
natantes capit: & cum paululum de ripa
se subduxerit, illam conquassans piscicu-
los captos excutit in terram ac deuorat.
Retrorsum etiam gradiẽdo ad nidulum
uesparum accedit, quòd sibi ab earum a-
culeis metuat: ac cauda in nidulum im-
missa, uespas excipit. mox his ipsis refer-

b 3 tam

ram extrahens proximo lapidi, uel arbori, uel parieti, uel maceriae illidit. omnibusq; uespis isto modo oppressis & interfectis nidulum uastat atque exinanit. Eadem cauda canem, cum eam insectatur, hac & illac per ipsius rictum ducta, eludit. At erinaceum, quod ob metum se in globum concludat, ut se spinis undique possit defendere, permingit, & eum suffocat. Etenim propter urinam in ipsius os influentem spiritum ducendi nullam habet potestatem. Ea uero uulpis, quae canis mediocris magnitudo est. Color autem saepe rutilus, priori tamen parte canescens: raro candidus, rarius niger. Fiber etiam & lutra egrediuntur ex riparum cauernis, in quibus latet, & se in fluminibus mergunt, ac pisces capiunt quibus uescuntur. sed fructus quoq; & cortices arborum comedunt. Lutra autem à lutando appellatur. Frequenter enim se lauat cum capiendi piscis causa se in aquas, imò saepe in earum profundum, penitus immergit. Corpus ei latius & longius fele, pedes breues, dentes acuti. à fibro cauda, posterioribus pedibus, pilis

lis differt. Nam lutra caudam habet longam & reliquarum quadrupedum similem: fiber piscis. squamis enim obducta, admodum pingue, latam ferè palmum, longam dodrantem. Is si iacet in gradibus, caudam et posteriores pedes demittit in flumen cum frigoribus cōglaciat: si natat, cauda mota quasi remigare solet. Lutrae autem pedes omnes caninis sunt similes: fibri priores caninis, posteriores anserinis. Etenim membranae quaedam digitis sunt interiectae. itaque hi ad natandū, illi ad eundū magis nati aptique. nam in aqua & in terra uiuit. Fibri uerò pilus est in cinereo cādīdus et inēqualis. ubique enim à breuib. duplo lōgiore existunt. sed lutrae fuscus nonnihil ad castaneae colorem deflectit & brevis ac equalis est, utriusque uerò nitidus, & mollis. quare utriusque pellibus concisis fimbrias uestium ex pellibus nobilibus confectarū, solent exornare: quanquam lutrae pelles longè praestant fibri pellibus. Fiber autem in primis prouidus est & solers. etenim fruticibus & arbusculis dente, tanquam ferro, resectis ante riparum cauer

nas cōstruit paruas quasdam casas, & in
ijs duos trēsue gradus, quasi quasdā ca-
meras; ut cum aqua fluminis crescens in
undauerit ripas, ascendere possit: cum
decrescens, descendere. Atq; etiam cum
arborem iam ferè secuit, quoties ictum
facit, toties suspiciēs considerat num sit
cafura. Timet enim ne, si eo ictu conci-
dat, ab ea, priusquam recedere de loco
possit, incautus opprimatur. Nec uerò
minus est constans in proposito quàm
solers. nam quam arborem ad ripas pri-
mo elegit secandam, eam non mutat, e-
tiam si longo temporis spacio disseccare
non possit. Hoc animal uenamur nō mo-
do propter caudam qua uescimur, & pel-
lem qua uestimur, sed etiam propter te-
stes, quibus ut medicamentis, utimur.
Eos castorea medici nominant. Fibrum
enim Græci uocant *καστορέα*. At me-
les exit è cauernis & uagant in syluis non
aliter atq; lupus, lupus ceruarius, lepus,
aper, ceruus, tragelaphus, tarandus, alce,
platyceros, caprea, ibex, rupicapra, da-
ma, & aliæ plures. Verum hæ animantes
in syluis cubant; posteriores tamen in al-
tissimis

tissimis montium saxis & rupibus. Meles autē auide appetit mel, ex quo nomē hoc duxit. Magnitudine est uulpis aut canis mediocris, cuius quodāmodo speciem præ se fert, maxime caninus. Nam eius duo sunt genera. Vnum canis instar digitatum, quod caninum uocant: alterum ungulas, ut fues, habet bisulcas, quod idcirco suillum appellant. Omnibus autē melibus crura sunt breuia, dorsum latum, cutis spissa, cuius in metu sufflatæ distētū, uitor Plinij uerbis, ictus hominum, & morsus canum arcent: quamquam, si quando cum iisdem pugnant, ualde mordent. Duris uestiuntur uillis, qui sunt uel albi uel nigri, & dorsum quidem abundat nigris, reliquum corpus albis, excepto capite, quod alternis quibusdam quasi lineis nigris & candidis à suprema capitis parte ad rictum ductis decoratur. Crassi autem meles non sunt, pingues tamen: quæ eorum pinguitudo inuncta, uel cū alijs infusa, renum dolores sedat. Ex huius animalis pelle collaria fiunt, quæ ex eo melia à Varro ne nominantur. In ripis etiā fluminum

et lacuū nidos fingūt halcyones. nec Ari-
stoteli latuit eas in fluuios ascēdere, sed
hyeme nō occultant. Auis est nō multo
maior passer. Cū aut marinæ halcyonis
corpus totū colorib. cæruleo, uiridi, sub-
purpureo, sed mistis insigne sit, adeo ut
neq; collū, nec alæ aliquo ex eis careāt, et
rostrū habeat subuiride, longū, tenue: flu-
uiatilis seu ripariæ pectus purpureū est,
collū & dorsum in uiridi cæruleū, alæ fu-
scæ, rostrū, ut etiā pedes, cinereū. Vescit
pisciculis & uermibus. Lagopus quoq;
in altissimarū Alpiū specub. iuxta glaciē,
quæ tota nūq; æstate solis calore calefa-
cta, uel alijs etiā anni tēporib. imbre dila-
psa diffundit, nidos cōstruit & cubat. Ex
pedibus, quos habet leporis instar uillis
& quidē candidis, non plumis, uestitos,
nomen traxit. Ei magnitudo columbæ.
Color hyeme candidus, æstate in candi-
do cinereus. Longe non uolat, sed Alpi-
bus se tenet. Captā non uiuit, nedū man-
suescit. Caro huius auis sano palato est
bona, ægroto salutaris. At aues, quibus
oculi diurno spacio sunt hebetes, acres
acutiq; nocturno, interdiu latere, noctu
ex

ex latebris euolare, & ad pastum solent accedere: quas idcirco nocturnas appellant. quales sunt uespertilio, bubo, ulula, noctua, nycticorax. Verum hæ non solum in tenebricosis mōtium & rupium cauernis latent, sed etiam in cauis arboribus, in edificijs desertis, sub tectis domorum magnificarum & templorum & turrium, quæ raro homines succedunt. Vespertilio autem uenatur culices & muscas, exedit pernas, aliasq; carnes suillas de trabibus suspensas. Cæteræ aues nocturnæ prosequuntur mures, hirundines, aues, scarabeos, apes, uespas, crabrones. Sed bubo etiam capit lepusculos & cuniculos. Ea omnium nocturnarum auium maxima ex sono, imò uerò gemitu, quem edit, mihi uidetur nomen inuenisse. Caput habet magnum: corpus anseris magnitudine, breue tamen & quasi decurtatum ac colore uarium: rostrum curuum, ungues adūcos, oculos grandes. Huic non multum dissimilis est ulula, sed minor: quæ item ex ululanti uoce nomen hoc traxit.

Cum his duabus cognationem habēt
noctux

noctuæ, sed differunt uoce. Nec enim ululant, uerum edunt sonum, quem Aristophanes *λερυγῶν* nominauit. Earum quatuor sunt genera. Vnum, cui pluma aurium modo eminet: quod maximum est, & alio uocatur. Alterum eximij candoris in gutture & uentre, alioqui candidis et luteis maculis alternis distinctum. Tertium paruum, quo, ut etiam sequenti, aucupes uenantur aues. Quartum minus illo: quod in rupibus saxisque uersat. Hoc, sicut & proximum, cinereis & candidis maculis uariat, item alternis.

Nycticorax autem, hoc est coruus nocturnus, niger est, ut alterius generis coruus, sed eo plerumque minor. At uespertilio, quæ ex uespere, quo euolat, nomen hoc duxit, muri nonnihil similis est. quare scite scripsit Varro: factus sum uespertilio, neque in muribus plane, neque in uolucris sum. Alas enim habet & uolat, quod ei non conuenit cum muribus: sed animalia parit, non oua, in qua re cum uolucrum natura non congruit. & foetus uberibus admotos lacte nutrit, cum uolucres cibos conquirant undique, quos in

os

os pullorū inferant. Præterea sunt ei dentes, quibus carent uolucres. Caput autem simile habet muri uel cani: aures plerunq; duas, raro quatuor: dentes serratos: corpus obscure fuluis pilis uestitum, rostrum tamen nigrum, item aures: alas duas, quæ ut draconis & piscis uolantis, non ex plumis constant, sed ex membranis, & quidem nigris. In utraq; uerò ala habet digitum, cui est unguis. caudam latam, & sicut alas membranceam, in qua duos pedes, quorum uterq; quinos habet digitos uncis unguibus armatos, quibus in parietibus & rimis cauernarum adhærescit. Aut enim pendet, aut uolat, aut iacet. Quia uerò pedes non oriuntur ex corpore, sed ex cauda, ei esse traditur coxendix una. Vocem acutam ut mus nō emittit, uerum ferè ut catellus latrat. Geminos autem, ut Plinius, uolitat amplexa infantes, secumq; deportat. Cauda & alis affixa dies aliquot uiuit. Quinetiam Troglodytæ, qui in Africa habitant interdū, maxime uerò meridie latent in suis specubus.

De primi generis animantibus, quæ
noctu

noctu uel interdiu in terræ cauernis delitescunt dormiuntue satis. Abeo ad secundi generis animantes, quæ certo anni tempore, ut dixi, subterraneas cauernas succedunt, & in eis graui somno pressæ menses aliquot, quasi mortuæ sine cibo consumunt, ac usq; ad finē eū latent, dum tepore ueris humo excitatæ reuiuiscunt, & reminiscuntur cibum, quem tanto tempore oblītæ erant sumere. Tamen si ex his de quibus iam dixi, aliquæ sunt etiam, ut omnis generis quædam bestię sunt, in harum numero, ut suo loco dicā. sed terrenas hic quoq; primò persequar.

Itaq; multæ quadrupedes hyemis aut æstatis tempore se in specus condunt. Etenim mures Alpini autumnō subeunt cauernas, in quibus æstate cubare consueuerunt. Nam in eis ex fœno, stramentis, sarmentis exstruunt cubilia, in quibus totam hyemem usq; ad uer erinaceorum instar cōuoluti delitescunt & dormiunt. In una cauerna plerunq; septem, aut nouem, aut undecim, aut tredecim. Mira uerò eis machinatio & solertia cū fœnū ac reliqua iam congesserūt. Vnus enim

enim humi stratus erectis pedibus omnibus iacet in dorso. in quem, tanquam in plaustrum quoddam, cæteri ea quæ congefferunt, conijciunt, & sic onustum, cauda mordicus apprehensa, in specum trahunt, & quasi quodam modo invehunt. ex quo euenit, ut per id temporis detricto dorso esse uideatur. Itaque posteaquam cubilia in specu strauerint, ipsum aditum atque os eius sarmētis & terra obstruunt & obturant, ut tuti à uentorum ui, ab imbris, à frigore esse possint. Tam autem arcte et grauiter dormiunt, ut effossi & extracti non excitentur antequam in sole expositi uel ad ignem locati concaluerint. Hic mus cognomen ex Alpibus in quibus nascitur, traxit. color ei est aut fuscus, aut cinereus, aut rutilus: magnitudo fere leporis: muris species ac figura, ex qua mus dicitur. Attamen mutilas habet aures & quasi decurtatas: priores dentes longos & acutos: caudā amplius duos palmos longā, pedes breues & uillis superius refertos: digitos pedum ursinis similes: ungues longos, quibus alte effodit terram: posterioribus pedibus

dibus non secus ac ursus ire solet, ac interdum ingredi bipes. Si cibus huic animati datur, eum in priores pedes sumit, ut glis: ut idem glis & simia erectus usque eo in clunibus residet quoad ipsum comederit. Vescitur non modo fructibus, sed etiam pane, carne, piscibus, iure, pulmento: cupide uero lacte, butyro, caseo. quæ cum mandit oris suctu sonitum sic uti porcellus edit. Multum dormit: at cum uigilat, semper aliquid agit, stramina, fœnum, rallas, linteola cubili suo importans, quibus os ita complet, ut nihil amplius capere possit. reliquum pedibus accipit & trahit. Cum irritatus exarserit iracundia, acriter mordet. Si quando inter se colludunt mures Alpini, ut catelli clamorem faciunt. Cum e cauerna montiuagi egrediuntur ad pastum, ex eis unus aliquis remanet iuxta illius aditum, quam potest diligentissime & longissime prospiciens. Is cum uel hominem, uel armatum, uel feram uiderit, sine mora clamat. quo audito undique omnes ad cauernam concurrunt. Eorum autem uox fistulæ acutæ & lædētis aures similis est. qua & mutationem

tationem aeris significāt, & sibi quid ad-
 uerſi accidere. Dorsum ualde pingue ha-
 bent, quum cæteræ corporis partes ſint
 macræ. quanquam hæc uere nec pingui-
 tudo nec caro dici poteſt: ſed, ut mamil-
 larū caro in bubus, inter eas eſt medium
 quiddam. Illud ipſum utile eſt puerpe-
 ris, & his quæ ex utero laborant. quibus
 etiam earum prodeſt pinguitudo. Vigi-
 lias præterea tollit. Glīres etiam hye-
 me nō ſolum in cauīs arboribus, de qua
 re ſuprà dixi, ſed in terræ latēt ſpecubus.
 Glīrem autem Ariſtoteles ἐλεῖον à uer-
 tendo nominat. Vertit enim & ſurſum
 uerſus inflectit caudam. qua de cauſa a-
 lii Græci καμψίουρον uocarunt: aliqui ue-
 rò σκίουρον, quòd cauda ſua uillis uestita
 & conferta, quaſi ſtabello corpus ſoleat
 inumbrare: aliqui μῶν σκίουρον, quòd præ-
 terea ſimilitudinem quandam gerat ſpe-
 ciemq; muris. ſicut etiam glis Fennicus,
 qui non cauda, non figura & liniamen-
 tis totius corporis, nō magnitudine, nō
 moribus, ſed ſolo colore differt à noſtra-
 te glire. nam in cādīdo cinereus eſt, cum
 glis noſtras ſit aut rutilus, aut niger. attamen

c

men

men in ea Sarmatiæ parte, quam hodie
Poloniam uocamus, inuenitur cui ruti-
lus color mistus cinereo. Vtrique autem
gliri, hoc est tam Fennico quam nostra-
ti, duo inferiores dentes sunt longi. uterque
cum graditur, demissam caudam trahit:
quum uescitur, cibum in priores pedes,
quibus ut mures utitur pro manibus, su-
mit: posterioribus & clunibus insistit. ue-
scitur uerò faginis glandibus, castaneis,
nucibus auellanis, pomis, & similibus
fructibus. Vtrique cum hyberno tempo-
re latet, pro cibo somnus. atque per id tem-
poris pinguescunt. Quare recte de glire
scripsit Martialis,

Tota mihi dormitur hyems, & pin-
guior illo

Tempore sum, quo me nil nisi som-
nus alit.

Eius autem caro dulcis. Etsi uerò glires
uiuunt in syluis, ut non immerito de eo-
rum penuria in Fundanio uel de admi-
randis Varro his uerbis conqueratur,
Glis nullus est in sylua mea: tamen uete-
res gliraria habebant. Quæ qualia debe-
ant esse, idem Varro libro tertio *Dere-
rustica*

rustica tradidit. Et hodie in quibusdam locis syluestribus incolę fodiunt tellurē, ut in eius cauernis glīres inhabitare, & quando uelint eos capere, & in cibo uti possint. Apud Romanos uerò gliribus uiuaria in dolijs Fuluius Hirpinus instituit, ut Plinius scriptum reliquit.

Mus autem Ponticus, quem hodie uocant Hermelam, hyeme solum in cauīs latet arboribus, ut suprà dixi. Est uerò totus niuis instar candidus, excepta cauda digitorum longa. eius enim dimidia pars, & quidem superior, nigerrima. Huic animanti magnitudo gliris. Persequitur mures & aues quibus uescitur. Eius pelles in preciosarum numero habēt: ut etiam muris quem Lassicium uocāt. is in cinereo cādidus est, nec duobus digitis crassior. At mus Noricus, quē Citellum appellant, in terrę cauernis habitat. Ei corpus ut mustelę domesticę, longum & tenue: cauda admodum breuis: color pilis, ut cuniculorum quorundam pilis, cinereus, sed dilutior. Sicut talpa caret auribus, sed non caret foraminibus, quibus sonum ut auis recipit. Dentes habet

C 2 muris

muris dentium similes. Ex huius etiam pellibus, quanquam non sunt preciosæ, uestes solent confici. Subit etiam terræ cauernas mus Pannonicus, cui color subuiridis, species mustelæ, magnitudo muris. Sorices quoq; quibus sunt aures pilosæ, hybernis mensib. se condunt in terra excauata. Mus etiam syluestris non tam in arboribus latet, quas ut glis & mus Ponticus scādit, quàm in terra, in cuius cauernas congerit fructus: in primis uerò nuces auellanas, & eas quidem optimas. Quare apud Germanos ex corilo nomen inuenit: nam ei nō pro cibo somnus, sed prouisum pabulū. magnitudine corporis nō differt à glire, uerum colore, qui ei fuscus: & cauda, quam non habet uillis confertam & plenam, sed ab eis nudam, ut cæteri mures.

Mus autem araneus ueluti reliqui mures domestici, non latet in terra, tametsi in ualle Ioachimica ex proximis domicilijs in cuniculos ingrediat, & in his uersetur. Alioqui hyberno etiā tempore in domibus nostris solēt uagari. qui ex eo, sicut mihi uidetur, est nominatus, quod
muri

muri similis sit: nempe pilis subnigris, ca-
pite longiusculo, cauda procera, tenui,
nuda pilis: & quod ut araneus parietes
scandat. Eum Græci uocant *μυγάλλω*.
Etenim speciem, ut dixi, gerit muris, &
mole corporis mustelæ magnitudinem
assequitur & exæquat. Eius morsus ple-
runq; est pestifer: sed ipse diuulsus aut
dissectus & uulneri impositus proprio
ueneno medetur. At in terra latent
aliquot mustelarū genera: nā plura sunt.
est enim mustela domestica, quā Græci
γάλλω, Germani ex sono quem edit, uise-
lam nominant. Ea plerunq; est in dorso
& lateribus rutila, raro subfulua: in gut-
ture semper candida. quin nōnunquam
tota candida reperitur, quanquam rari-
us. Corpus habet tenuē, & in longius du-
ctum: caudam breuē, primores dentes
breues, non sicuti mus, longos. Catulos
nuper natos, quia ab hominibus & non
nullis alijs animantibus eis periculū me-
tuit, singulis diebus aliō transfert. Perse-
quitur mures, depugnat cum serpenti-
bus, sed ut à ueneno tuta sit prius edit ru-
tam. Vbera uaccarū mordet, quæ quā

primū in tumore fuerint, mustelina pelle perfricata sanant. hec mustela si nostrę domi uiuit, etsi habet suas cauernas, non diu ac multū se cōdit: si ruri, hyberno tēpore in specub. latet. Secundū mustelarū genus Germani iltis nomināt ex Græco uocabulo *ixlus*, quo erudita illa gēs appellat syluestre mustelā. id uero habitat in riparū cauernis, ubi lutræ & fibri more pisces captos comedit: & uersat in syluis, ubiprehendit aues: in domibus, ubi gallinas: quare Plinius eam esse domesticam dicit: quarum sanguinē exugit. sed ne clamare possint, earum capita primo mordicus aufert. Atque etiam earundem oua, quæ furari solet, ac multa in unum congerere, exorbet. Aliquanto maior est mustela domestica, minor ea syluestri, quę martes uocatur. pilos habet inæquales & non unius coloris. Etenim breues subfului sunt: longi, nigri. qui sic ex multis corporis partibus eminent, ut distinctæ nigris maculis esse uideant. attamen circa os est candida, cum grauit̃er exarserit, male olet. Quocirca nostri uilissimū quodq; scortum, & maxime

xime foetidum, pellem ictidos solent nominare. Tertium mustelæ genus etiam sylvestre, in saxorum rimis & cauernis cubat, quod à Martiale martes, à Germanis martarus nominatur. Martialis uersus hic est in libro decimo Epigram. ad Maternum,

Venator capta marte superbus adest.
Ei magnitudo felis, sed paulo lōgior est.
crura uerò habet breuiora, itemq̃ breui-
ores ungues. Totum eius corpus pilis in
fuluo subnigris uestitur, excepto guttu-
re, quod candidum est. Hæc mustela, si-
militer atq̃ proxima, ingreditur domos
& necat gallinas, earumq̃ sanguinẽ exu-
git, & oua exorbet. Quartum muste-
le genus item sylvestre, in arboribus uita
uiuít, quod etiam uocabulo martis ap-
pellatur. Ea mustela syluas insolenter &
raro deserit: atque in hoc differt à proxi-
ma superiore mustela: & insuper quod
guttur eius lutei sit coloris, & quod reli-
qui corporis pilus magis sit obscure ful-
uus. Huius duo genera quidam esse cen-
sent: unum quod in fageis syluis uersat:
alterum quod in abiegnis, atque id sanè

est aspectu pulchrius. Quintum mustelarum genus omnium pulcherrimum & nobilissimum est, quod Germani zobelam uocant: in syluis, ut martes de qua iam dixi, degit. ea paulo minor, tota tamen obscure fulua, praeter guttur, quod habet cinereum. Mustelae horum trium generum bonitate ceteris omnibus eo magis praestant, quo plures pili candidi cum fuluis permixti fuerint. Zobelinæ autem pelles precij maioris sunt quam panni auro texti. Etenim comperi optimas quadraginta numero, tot enim uno fasciculo colligari & unam uendi solent, plus quam milibus nummum aureorum uenisse. Omne autem mustelarum genus ira incitatum graue quiddam olet, sed maxime id quod Germani iltis appellant, omnis praeterea mustelae stercus aliquantum redolet muscum. Noerza autem, quae item in syluis uersatur, magnitudine est martis: pilos uero habet aequales, & breues, atque colore ferè similes lutrae pilis: sed noerzae pelles longè lutrae pelibus antecellunt. atque haec etiam praestant si pili candidi cum reliquis fuerint mixti.

Reperi

Reperitur hoc animal in vastis & densis syluis quæ sunt inter Sueuum & Vistulam. Et si uero mustelæ omnes nec hybernis latent mensibus, neq; subeunt terram, tamen earum formas expressi singulas, quod id, ut arbitror, rerum naturalium studiosis utile sit futurum. At uerra quæ cuniculos ex specubus exturbat, paulo maior est mustela domestica. Color ei in albo buxeus. Audax hoc animal & truculentum, ac omni ferè animantium generi infensum atq; inimicum natura, sanguinem earum quas momorderit ebibit, carnem non ferè comedit. Istius generis est etiam hamester, quem quidam Cricetum nominant. Etenim existit iracundus & mordax adeo ut si eum eques incaute persequatur, soleat prosilire, & os equi appetere: & si prehenderit, mordicus tenere. In terre cauernis habitat, non aliter atq; cuniculus, sed angustis: & idcirco pellis, qua parte utrinque coxam tegit, à pilis est nuda. Maior paulo q̃ domestica mustela existit, pedes habet admodum breues. Pilis in dorso color est ferè leporis; in uentre niger, in lateribus

teribus, rutilus. Sed utrunq; latus maculis albis, tribus numero distinguitur. Suprema capitis pars, ut etiam ceruix, eundem, quem dorsum, habet colorem. tempora rutila sunt, guttur est candidum: caudæ quæ palmum longa est, similiter leporis color. Pili autem sic inhærent cuti, ut ex ea difficulter euelli possint. Ac cutis quidem facilius à carne auellitur quam pili ex cute radicitus extrahantur. Atq; ob hanc causam & uarietatem pelles eius sunt preciosæ. Multa frumenti grana in specû congerit, & utrinq; dentibus mandit. Quare nostri hominem uoracem huius animantis nomine appellât. Ager Turingiæ eorû animalium plenus ob copiâ et bonitatē frumenti. Viuerre minor est uormela, & magis uaria. Etenim præter uentrē, qui itē niger est, totū corpus albis, subluteis, rutilis, obscure fuluis maculis decorat. Cauda etiā, quæ longa sequi palmū, habet pilos cinereos cū candidis permistos, sed extrema parte nigros.

Haftenus dixi de murium & mustelorum ac cognatorum animalium generibus, quorum maxima pars succedit ca
uer

uernas subterraneas : nunc de histrice dicam, qui item in specus secedit, sed æstiu-
is mensibus. idq̃ facit contra morem
cæterarum animantiũ. Eum Græci qui-
dā ἀκρωθόχοιρον uocant, quòd & similitu-
dinem gerat speciemq̃ porci bimestris,
& spinis erinacei instar hirsutus sit : attamē
caput habet leporino similius : aures
humanis, pedes ursinis. Iuba ei est supe-
riori parte erecta & priori caua, tubercu-
la cutis, quæ ex utraq̃ oris parte sunt, se-
tas longas & nigras continent ex eis na-
tas. quin reliquæ etiam setæ sunt nigræ.
Primæ spinæ à medio oriuntur dorso &
à lateribus, sed lōgissime à superiore eo-
rum parte. Quæ singulæ partim nigræ,
partim candidæ sunt : longæ duos uel
tres uel quatuor palmos. quas, si quando
libitum fuerit, ut pavo caudam erigit. In-
gressurus in caueā demittit. irritatus ira-
cundia cum cutem intendit, missiles in
in ora urgentium canum infigit, aut tãto
impetu iacula ut in ligno figat. Dentes
ut lepus quatuor habet longos, duos su-
periori parte, & duos inferiori. Noctu ui-
gilat, interdii dormit. Vescit pane com-
minuto

minuto, pomis, piris, rapis, pastinacis. bibit aquam, sed cupide uinum dilutum. Hoc animal gignit India et Africa, unde ad nos nuper allatum est. Vrsi præter ea se hyemis tēpore in specuū latebras, quas locus ipsis suppeditat, conijciunt. quòd si nullas suppeditet, eas priorib. pedibus pro manib. usi, faciūt ex ramis & fruticibus cōgestis et ita constructis ut non recipiant imbres. in quæ latibula supini irrepunt. Timent enim de suis uestigijs, quòd in solo impressa eos uenatoribus prodant. Mares autem quadraginta dies, foeminae quatuor menses se occultant latebris: quo tempore candidam informemq; carnem & pariunt & lambentes sensim in propriam formāt figuram. quod nō ignorauit Ouidius qui canit:

Nec catulus partu, quem reddidit uersa recentī,

Sed male uiua caro est. lambendo mater in artus

Fingit, & in formam, quantam capit ipsa, reducit.

Abditi primum iacent & arctius dormiunt ad dies quatuordecim, multūq; tam graui

gravi somno fiunt pingues. deinde resident & priores pedes fugētes uitam ducunt. Ex latibulis uerò rursus prodeunt uere: mares ualde pingues, foemine non item, q̃ pepererint eo tēpore. aluū astrictā soluunt aro herba deuorata. Etsi uerò ursi sunt auidissimi cædis, tamen ursæ in homines si prostrauerint se, & os ad terram uerterint, ac aerem spiritu nō duxerint, nullam adhibēt fæuitiam: sed eos tantummodo odorantes, tanquam mortuos, quos odisse existimant, relinquūt. ursi autem hominibus nostris noti sunt: multos em̃ regiones frigida gignūt, & quidem fuscas aut nigros. quorum duo sunt genera, magni & parui. hi facilius arbores scandunt, & in tantam magnitudinem, in quantam illi, nunquam crescūt. Vtriq̃ comedunt carnes, mel, fructus arborum, herbas. Mysia uerò albos ursos gignit, qui pisces, ut lutra & fiber, capiunt. Latet etiā in terra hybernis mensibus lacerta: quanquam fuerunt qui negarent eam semestrem uitam excedere. reliquis autem anni temporibus plerūq̃ in rubetis & spinetis solet uersari, ei quadru

drupedi lingua bifida et pilosa: pedes humiles: uerno tēpore uiridis color, æstiuo nonnihil pallidus. Latet lacerta Chalcidica, ex ærei coloris lineis, quib. tergū eius distinguit, nominata. Eadē seps uocat, q̄ uulnus, si quē momorderit, putrescat, & sanie male olēte soleat manare. à lacerta uiridi nō corporis figura differt, sed colore tantū. Latet lacerta aquatilis, cuius uita est in aqua & in terra, sed crebrius in aqua. Gignit in lacunis opacis, quę in pingui solo sunt, & in quibusdam mœniorū fossis. Parua est, & hāc præter ea habet ab alijs lacertis in colore dissimilitudinē, quòd ipsa uel cinerea sit, uel in cinereo fusca. Testudinis aut salamadrę instar tardius ingredit. Irritata si exarscrit elata, & quodam modo inflata, rectis pedibus insistit & terribilis oris hiatu acriter oculis intuetur eum à quo fuerit lacerata: manatq̄ sensim lacteo & uiroso sudore usq̄ dum tota fiat candida. Imposita salī caudam mouet ac effugere conatur. nam eum quia ualde mordet, nō potest ferre, statimq̄ moritur: cum alioqui uerberata diu uiuat. Latet chamaeleon

leon, in India & Africa natus: cuius, ut
Aristoteles scribit, corpus in lacertæ fi-
guram est formatum. Eius uerò, ut pisci-
um, & latera deorsum ducta & directæ
cum uentre iunguntur, & spina lateribus
imminet. Facies simillima simiæ, quam
Cebum uocant. Cauda prælonga, quæ
in tenue desinit, & lori modo permultis
implicatur orbibus. Quum steterit al-
tius quàm lacerta abscedit à terra. Crura
nō aliter ac lacerta inflectit. singuli eius
pedes diuisi sunt in binas partes. quæ ta-
lem inter se habēt situm, qualem pollex
ad reliquam manus partem ei oppositā.
Quin etiam hæ ipsæ partes singulæ pau-
lulum in digitos quosdam diuisæ sunt:
priorum quidem pedum interiores tri-
partito, exteriores bipartito: posteriorū
uerò interiores bipartito, exteriores tri-
partito. Digiti præterea unguiculos ha-
bent similes unguibus animantium, qui-
bus sunt adunci. Totum corpus crocodi-
li instar asperum. Oculi in recessu cauo
positi prægrandes, rotundi, obducti cu-
te simili reliqui corporis cuti. in quorum
medio exigua relicta est regio, qua ui-
des

det: eam nunquam cute operit. Oculum
uersat in orbem, & aspectum quoquo
uersus refert, atque ita quod uult cernit.
Mutat colorem inflatus: cum aliàs niger
à crocodili colore non multum differat:
& ut lacerta, pallidus sit. nigris tamen, ut
pardus, maculis est uariis. Fit autem mu-
tatio coloris totius corporis. Nam & o-
culorum & caudæ color nō aliter ac reli-
qui corporis mutatur. motus eius, ut te-
studinis, admodum tardus est. Pallefcit
cum moritur, & uita defuncto idem co-
lor insidet. Gulam & asperam arteriam
eodem situ cōtinet quo lacerta. Carnem
nusquam habet nisi in capite & maxil-
lis, cætera membra carent ea. Exiguæ ue-
rò carūculæ sunt maxillis & caudæ, qua
parte corpori est agnata. Sanguinē tan-
tummodo habet in corde, in oculis, in
loco cordis superiore, & in uenis hinc
ductis: atq; in his quidem perpaucum.
Cerebrum paululum supra oculos posi-
tum, & cum eis continēs est. Cute autem
oculorū exteriorē detracta complectit̃
quiddam quod uelut annulus æneus te-
nuis pellucet. Membranæ multæ ac ro-
bustæ

bustæ & quæ multo præstant his quæ ceteris sunt, distribuuntur in totū eius corpus. Totus dissectus diu spirat, quòd exiguus admodum motus adhuc in ipsius insit corde. Cum omnes corporis partes contrahit, tum uel maxime costas. Lienē qui conspici possit, nusquam continet. Aura uerò perhibetur alii; unde Ouidius non modo dulcis, sed etiā doctus poeta:

Id quoq; quod uentis animal nutritur
& aura

Protinus assimilat tetigit quoscunq;
colores.

Stellio etiam latet. figura similis est lacer-
tæ, natura chamæleonti. nam rore tātum
uiuit, & præterea araneis & melle. Eum
Nicander ἀσκέλαβον, Aristoteles ἀσκα-
λαβώτῳ nominat. Etenim illius tergum
guttis stellarū instar lucentibus pictum:
ex qua re etiam apud Latinos nomē in-
uenit. atq; hoc differt à lacerta. Idem γα-
λιώτης à Græcis uocāt. Vt anguis exuit
uere membranam hybernā tanquam
senectutē: eamq; nisi præripiatur deuor-
at. Quem momorderit stellio stupor op-
primit. In Græcia est uenenatus & pesti-
fer

fer, in Sicilia innocens. Aduersatur scorpionibus. uitam agit in sepulchris, in cameris, in locis ostiorum & fenestrarum.

Latet præterea hybernis mensibus salamandra. Etenim hoc anno in Februario Snebergi maxima uis salamandarū ex uicinis locis collecta agglomerataq; in ultima cuniculi cuiusdam, quondam in Molebergum montem acti, tunc uerò instaurati, parte fuit reperta. Et proximo anno in Nouembri salamandra uiua ex fonte finitimæ syluæ per fistulas in hoc oppidum influxit. Pluuia autem & subsequens serenitas salamandras excitant ex uenis, fibris cōmissurisq; saxorū. hāc quadrupedem, cui item lacertæ figura, Germani, quia propter crura breuia tarde graditur, Græco nomine *μόλυβδω* appellant. Caput ei magnum, uenter lutei coloris, ut etiā ima caudæ pars: reliquum corpus totum alternis maculis nigris & luteis quasi stellatum distinguitur. Propter frigus ignem, non aliter ac glacies, extinguit: quo modo etiam oua serpentium in ignem camini cōiecta flammam solent extinguere, attamen tam ipsa oua quā

quàm salamandra comburunt. Salamandra autem irritata saniem euomit lacteā. huic animali nec masculinum nec foeminum genus falso putant esse. Testudo etiam terrestris totam hyemē in terra latet, atq; graui somno pressa tempus sine ullo cibo traducit. Scarabei deniq; rutili, & grylli, qui potissimū noctu strident, aridam fodiunt terrā, ut in eius cauernis cubent æstate: grylli domestici etiam hyeme. Nam scarabei ante autumnum, imò prius intereunt q̃ tota æstas effluerit: grylli agrestes ante hyemem, ut etiam aranei nigri, qui similiter habitant in terræ rimis. At scolopendra in truncis arborum, aut in lignis supra terram locatis, aut in palis terræ infixis, unde nomen inuenit, cum putrescunt & gignitur & uiuit. quibus amotis aut cōmotis egreditur: aliàs plerunq; solet latere. Pennis caret, sed plurimos habet pedes: quocirca eam ex Latinis alij multipedā, alij centipedā, alij millepedam uocarūt. si quādo repit, partem corporis mediam tanquam arcum intēdit. si bacillo aliā uere tangitur, se contrahit. Color ei æneus,

d 2

corpus

corpus tenue, nec ualde latū, longū uerò
tres digitos, aut summū quatuor. Iam in
uolucris, quę se cōdūt, hirūdines riparię
sunt. Eteñ plures numero inter se nexę
hybernīs mētib. latēt in ripis fluminū, la-
cuū, paludū, & in littorib. ac scopulis ma-
ris, unde accidit ut piscatores interdū ita
inter se iunctas ex aquis extrahāt. Dictę
autem sunt riparię, quòd soleāt ripas ex-
cauare, & in eis nidos construere ac latē-
re, has Græci & ἀποδες uocāt, nō quòd
sine pedibus sint, sed eorum careant usu:
& κυψέλας, quòd oua pariāt & excubēt
in cistellis longis, ex luto fictis: quibus
aditus sit angustus, ut omni anni tempo-
re belluas & homines uitare, hyeme à fri-
goribus tutę esse possint. Hoc differunt
ab hirundinibus tam agrestib. q̃ dome-
sticis, quòd tibias habeant hirsutas. Hę,
inquit Plinius, sunt quę toto mari cer-
nuntur, nec unquam tam longo naues,
tamq̃ cōtinuo cursu recedunt à terra, ut
non circumuolitent eas apodes. Cætera
genera residunt & insistent, his quies ni-
si in nido nulla: aut pendent, aut iacent.

Hyeme etiam in cauernis montium,
etsi

et si non in his solis, latēt uespertiliones, bubones, ululæ, noctuæ, hirūdines, sturni, palumbes, turtures, merulæ, turdi, alaudæ, upupæ: de qua re suprā dixi.

Iam ex aquatiliū quæ latent genere quædam hyeme, quædam æstate condūt se uel in cœno, uel in arena: & ita quidē se in ijs condunt, ut reliquum corpus totum tegatur, os sit liberū. Hybernīs mensibus hi pisces condunt se, primadię, hip purus, coracinus, murena, orphus, conger, turdus, merula, perca, thynnus, raia & omne genus cartilagineum, cochleæ. Aestiuis uerō mensibus condit se glaucus, asellus, aurata. Tricenīs diebus circa canis ortum purpura, buccinum, pectē, delphinus. Iam in numero animantiū quarum uita est in terra pariter & in humore latet hyeme lacerta aquatilis, de qua suprā dixi. Crocodilus quoq; spē cū eiusdē hyemis uitadæ causa succedit, & in eo quatuor latet menses. Frigus adeo moleste patitur, ut etiam cum nō solet latere, interdū in terra uersetur, in aqua noctu. Viuis in Europam raro nūc affertur: sed mortuū saepe pharmacopœ
d 3 læ

lae in officinis suis de trabe suspendunt. Plinius eius figuram & naturā diligēter est persecutus. quadrupes malū, inquit, & terra pariter ac flumine infestū. Vnū hoc animal terrestre linguae usu caret: unū superiore mobili maxilla imprimit morsum, aliās terribile pectinatim stipāte se dentium serie. Magnitudine excedit plerunq; duodeuiginti cubita. Parit oua quanta anseres, eaq; extra eū locum semper incubat praediuatione quadā, ad quem summo auctu eo anno egressurus est Nilus. Nec aliud animal ex minori origine in maiorem crescit magnitudinem. Et unguibus hic armatus est, & cōtra omnes ictus cute inuicta. Hunc saturum cibo pisciū & semper esculento ore in littore somno datum, parua auis, quae trochilos ibi uocat, rex auium in Italia, inuitat ad hiandum pabuli sui gratia, os primo eius ad sultim repurgās, mox dentes & intus fauces quoq; ad hāc scabendi dulcedinem quā maxime hiantes. in qua uoluptate somno pressum conspīcatus ichneumon, per easdem fauces, ut telum aliquod, immissus erodit aluum.

In

In eo maior erat pestis, quàm ut uno esset eius hoste natura contēta. Itaq; & delphini immeantes Nilo, quorum dorso, tanquam ad hunc usum, cultellata inest pinna, abigentes eos praeda, ac uelut in suo tantum amne regnātes, alioquin impares uiribus ipsi, astu interimūt. in uentre mollis est tenuisq; cutis crocodilo, ideo se ut territi immergūt delphini, subeuntesq; aluum illa secant spina. Quin et gens hominum est huic belluæ aduersa in ipso Nilo, Tentyritæ ab insula in qua habitat appellata. Mensura eorū parua, sed præsētia animi in hoc tantū usu mira. Terribilis hæc contra fugaces bellua est, fugax contra insequentes. sed aduersum ire soli hi audent. quinetiam fluminis innatant, dorsoq; equitantium modo impositi, hiantibus resupino capite ad morsum, addita in os claua, dextra ac læua tenentes extrema eius utrinq;, ut frenis in terrā agunt captiuos. Ac uoce etiā sola territos cogūt euomere recētia corpora ad sepulturā. itaq; ei uni insulæ crocodili non adnatant, olfactuq; eius generis hominum, ut Psyllorum serpentes, fud 4 gantur

gantur, hebetes oculos hoc animal dicitur habere in aqua, extra acerrimi uisus. Quidam hoc unum quamdiu uiuat crescere arbitratur, uiuit aut lōgo tempore.

Latent etiam hybernis mēsis in terra ranæ omnes, exceptis tēporarijs istis minimis, quæ pallent in cœno, & reptāt in uīs & littoribus. Hæ enim quia nō ex semine, quod effundunt mas & fœmina cum complexu uenereo iunguntur, sed ex puluere æstiuīs imbribus madefacto oriri uidētur, diu in uita esse nō possunt. Itaq; cōditur uiridis illa parua, quā Græci & καλαμίτιω uocant, quod in arundinetis agere consueuerit: quanquā etiam arbores scandit, atque in herbis uiuit: & βρέξαντα, quod sono sui generis pluuias futuras prænūciet. Nec enim, ut Plinius à nobis dissentiat, est muta & sine uoce. Verno tempore sæpenumero uidet̃ ex terra eminere media, media adhuc in ea latēre. Conduntur uirides ranæ, quæ uersantur in fluuijs atq; piscinis, & hæ quidem uocales & edules sunt. Conduntur subliuidæ & subcinereæ, quæ item in fluuijs, lacubus, paludibus, lacunis uiuunt.

hæ

hę partim uocales & edules sunt, partim
 mutę & nō eduntur; quas hybernīs men-
 sibus in terra latēre argumēto est, quōd
 uerno tempore non tantum earū fœtus
 conspiciātur in lacunis, sed ipsę ueteres
 etiam ranę. Quare uerum non est quod
 scribit Plinius; mirumq; semestri uita re-
 soluuntur in limū nullo cernente, & rur-
 sus uernis aquis renascuntur, quę fuere
 natę; perinde occulta ratione, cum om-
 nibus annis id eueniat. fœtus aut earum
 sunt primo carnes paruę, rotundę, nigre,
 dein oculis tantū et cauda insignes: quas
 Nicāder quia caudā mouēt, *κολονείδας*,
 Aratus quia rotundę, *γυείνους*, alij Gręci
βαβαχίδας, quasi dicas ranūculos, nomi-
 nant. quorum postea figurantur pedes,
 priores ex pectore, in posteriores findit
 cauda. Conduntur pręterea ranę palli-
 dę in hortis agentes, quę nō comedun-
 tur & mutę sunt. Conditur deniq; rana
 rubeta, quę ex rubis, sub uepribus enim
 uersari solet, nomen inuenit. eam poeta
 bufonem, Gręci *φρυγών* uocāt. Duo eius
 genera, altera terrena, quę in domibus
 & uepribus agit; altera palustris, quę sui

d s gene

generis uocem edit. Vtraq; si bacillo sæpius uerberet, inflato corpore uirus primò e clunibus exprimit longius, deinde sudat: cuius sudoris lactei guttæ admodum grauis & putidi sunt odoris: ac cū occiditur ferè opij: occiditur autem difficulter. Rana rubeta mulieres ueneficæ quondam ad ueneficia sunt usæ. Mus quoq; aquatilis hyeme latet in ripis fluminum & riuorum quos incolit. Ei magnitudo ferè muris syluestris, mordet sæpe manus piscatorum, cum ex foraminibus riparū cancos fluuiatiles extrahūt. Vorat pisciculos paruos, quales sunt gobiones fluuiatiles & alburni: uorat fœtus lucij, salaris, barbi, aliorumq;. quocirca ubi magna uis id genus muriū nascit, riuus uastitatē solet inferre. Cancer etiā fluuiatilis succedit ripas, & in eis hyeme latet, æstate plerunq; uersatur. Iam deniq; in serpentium genere, qui maxima ex parte terreni sunt, uipera, quam Græci *ἐχιδνῶν* uocant, hyeme subit saxa. Ea longa est circiter cubitum, & maculis in cinereo fuscis plena. Primò intra se oua parit: dein his exclusis uiuas animantes.

nec

nec tamē ipsa catulos singulos, ut Nican-
 der & Plinius scribūt, diebus singulis pa-
 rit uiginti numero: nec cæteræ tarditatis
 impatientes perrūpunt latera occisa pa-
 rente: sed ut nobis serpentium speculato-
 res affirmant, uno eodemq; die catulos
 plerunq; undecim, plures interdum pa-
 rit: & quidem eis superstes uiuit. Nec ue-
 rò etiam cum uiperæ cōmiscent corpo-
 ra sibi circumuolutæ foemina maris ca-
 put insertum in os, ut idem Plinius scri-
 bit, abrodit uoluptatis dulcedine. nō au-
 tem mas modo, uerū etiam foemina na-
 tura breuē & quasi mutilam habet cau-
 dam, non ut pleræq; aliæ serpentes lon-
 gam: sed differunt inter se. etenim foemi-
 næ caput est latum, maris acutum. Cum
 hic mordet ac uirus euomit, apparēt ue-
 stigia duorum dentium acutorum: cum
 illa, plurium. Minori autem uiperæ di-
 p̄sas est assimilis: quæ cum alba sit, eius
 caudam duæ nigræ distinguunt lineæ: à
 se ictū inexplibili siti enecat, ex quo no-
 men hoc duxit, quin ipsa multū sitit. quo
 circa immoderato potu onustæ umbili-
 cus rumpitur, & grauius onus effundit.

hanc

hanc alij caufonem, alij preftere uocant. sed prefter ut corporis forma non multum à diptade differat, effectū differt. nā ictum extemplo fideratione quadā reddit immobilem ac mente alienum. mox pilis diffluentibus cum pruritu ac uētris solutione absumit. Condit etiam se in terra, sicuti cæteræ serpētes ferē omnes, uel in saxorum rimis cæcula: ex cæcitate apud Germanos quoq; nominata. quā eadem de causa Nicander τυφλῶπα, alij τυφλῖνον nominant. etenim caret oculis. Color ei in luteo uiridis, & ualde splendens. nunq; pede est longior, nunquam digito crassior. ea sicut & uipera, ut Columella scriptū reliquit, sæpe cum in pascua bos improuide supercubuit, lacerata onere morsum imprimit. Quin amphibæna hebetes habet oculos. itē parua est & tarda, sed biceps. quare alterutro capite, cum ei libitum fuerit, progredi uel regredi potest. unde ei nomen impositum. densæ cuti color insidet terræ, uarijs notis distinctæ. Huic non dissimilis est figura scytale, sed pinguior. ei crassitudo quæ manubrio ligonis, longitudo

tudo quæ lumbrico. hæc cum uerno tem-
pore exuias posuerit, fœniculo, ut cæte-
ræ serpentes non uescitur. ex baculo no-
men inuenit. Tum hybernis mēsis
in caua terræ uel loca saxosa ingredi-
trix à natando appellata. qua de causa à
Græcis ex aqua ὄφιοῦ nominat̃: & χόρ-
σος, quod & in terra & in aqua uer-
setur. Nec assentior Lucano qui cherfy-
drum à natrice distinguit. Est autem infe-
sta & inimica ranis, forma non differt ab
aspide, sed colore, qui ei plerunq; in cine-
reo candidus. Ex natricum genere uide-
tur esse Calabricus serpens, etiam si ma-
culosus sit. Eum his uersibus describit
Virgilius:

Est etiam ille Calabris in saltibus an-
guis,
Squammea conuoluens sublato pe-
ctore terga,
Atq; notis longam maculosus gran-
dibus aluum,
Qui dum amnes ulli rumpuntur fon-
tibus, & dum
Vere madent udo terræ, ac pluuiali-
bus austris

Stagna

Stagna colit, ripisq; habitans hic piscibus atram

Improbis ingluuiem, ranisq; loquacibus explet.

Postquam exhausta palus, terreq; ardore dehiscunt,

Exilit in siccum, & flammantia lumina torquens

Sæuit agris, asperq; siti & exterritus æstu.

Ex natricum præterea genere sunt boæ, in tantam, Plinio autore, amplitudinem exeuntes, ut diuo Claudio principe occisæ in Vaticano solidus in aluo spectatus sit infans. Alunt primo bubuli lactis succu, unde nomē traxere. sunt enim nihil aliud quàm domesticæ atque uernacule natrices. Aspīs autem est longitudine quatuor pedū, crassitudine hastæ. Color non eis unus, nā alijs squalidus, alijs uiridis & uariis, alijs cinereus, alijs igneus: maxime Aethiopicis. Oculi hebetes in temporibus & iuxta supercilia carunculae instar calli eminēt. quocirca quasi somniculosa nictare nō cessat. sed animantium strepitu facile excitat. Gignit eam

Aegy

Aegyptus, Aethiopia, & cæteræ regiones Africæ. Coniuge, utor Plinij uerbis, fermè uagantur, nec nisi cum cõpare uita est. itaq; alterutra interempta, incredibilis alteri ultionis cura. persequit interfectore, unumq; eum in quantolibet populi agmine noticia quadã infestat. perumpit omnes difficultates, permeat spacia, nec nisi amnibus arcetur, aut præcæleri fuga. Huic ichneumõ, qui similis est mustelæ domesticæ, quam Græci *ixtidæ* uocant, maxime inimicus est. itaq; non tantum eius oua perdit, sed ipsum etiam interficit. etenim mergit se limo sæpius, siccatoq; sole. mox ubi pluribus eodẽ modo se corijs loricauit, in dimicationẽ pergit. in ea caudam attollens ictus irritos auersus excipit, donec obliquo capite speculatus inuadat in fauces. aspides autem Galenus in tria distribuit genera, in chelidonias, cherseas, ptyadas, à sputo cognominatas: quas Cleopatra sibi admouit. Aspis uerò frigoris impatiẽs hyeme inclusus atq; abditus latet in arenis: ut in cauis fagis aut quercubus dryinos: ex qua re nomen inuenit. eam aliq, ut Nicander

cander scribit, hydron, alij chelydrō nominant, est enim natrici, quod ad caput attinet, similis, sed tergum habet cinerei coloris, crassitudo & lōgitudo ei est mediocris anguillæ. grauiter olet. ranarum fœtus, cauda insignes persequit̃: & eam contra musca magna. At ceraſtes ex cornibus nomen traxit, quæ modo cochleæ instar gemina, modo quadrigemina gestat in capite: & quidem corporea. quorū motu, scribit Plinius, reliquo corpore occultato sollicitat ad se aues. alioqui in uiperæ figuram est formatus. Color ei squalidus. in frigidis tamen regionibus reperit̃ natrici similis figura & colore: quanquam raro in his reperiri solet. In Africa in arenis & orbitis uersatur: alibi plerunq; in saxorū rimis, in quibus latet hyberno tempore. Aristoteles colubros etiam Thebanos tradit esse cornutos. Hæmorrhœos quoq; in saxorū rimis agit. ea ex profluente sanguine nomen inuenit, nam cum aliquem momorderit prima nocte sanguis erūpit ex auribus, ex naribus, ex ore unā cum sputo, ex uesica cum lotio, ex uulneribus cum sanie

sanie. gū
sub ungi
hemor
tem lon
nim pat
colore
fronte
pore
de lūp
figura
cari, &
putred
sum, u
Aelia
capite
moru
re
panca
de
alteru
nigru
& hic
tis cu
nust
latim
sumis

fanie . gingiua præterea & caro quæ est
sub unguibus, stillant sanguine, si quem
hemorrhoids foemina momorderit. est au-
tem longa pedē, non multum crassa. ete-
nim paulatim in tenuē caudam desinit.
colore aliàs cinereo, aliàs candente. Ex
fronte eminent duo cornicula, item cor-
porea. oblique ac tardius serpit, & perin-
de strepit ac si arundines transeat. Huic
figura similis est sepedon, sed corniculis
caret, & contrarie serpit. color ei ruber, à
putredine, quæ mox sequitur eius mor-
sum, nominatur. Porphyryus uerò, ut
Aelianus tradit, palmi est magnitudine,
capite candidissimo, reliqua purpureus,
morsu innocuus, quippe qui dētibus ca-
reat. inuenitur in Indiæ locis uadosis. ca-
ptam cauda suspēdunt, uiuētisq; ex ore
defluentē liquorē legūt in uasculis greis.
alterum item ex iam defuncto liquorem
nigrum similiter in altero uase excipiūt.
& hic quidem in esculentis seu poculen-
tis cum grano sesami datus tabe lenta u-
nius uel etiā duorum annorū spacio pau-
latim enecat: ille more cicutæ statim ab-
sumit. Acontias aut, quem Latini iacu-
e lum

lum appellant, ex arborum ramis se iaculi instar uibrat in animal quod præterierit: ex qua re nomen reperit. nec uerò solum desuper se uibrat in animal, sed humi positus, si fuerit laceffit, iaculi modo corpus intorquens eminus petit aduersarium. Cenchris uerò, quā Nican- der cēchrinen uocat, ex eo quòd crebris maculis milij semini colore similibus, sit interstincta nomen inuenit. de qua Lu- canus:

Quam semper recto lapsurus limite
cenchris

Pluribus ille notis uariatam tingitur
aluam,

Quam paruis tinctus maculis The-
banus ophites

Concolor exustis atque indiscretus
arenis.

At basiliscus ex eo nominatur, quòd ita ueneno cæteris serpentib. præstet, ut rex purpura & insignibus regijs ijs, in quos dominatur, antecellit. Caput ei acutū, & color flauus. Cyrenaica, inquit Plinius, hunc generat prouincia, duodecim non amplius digitorū magnitudine, candida
in

in capite macula, ut quodam diademate
insignem. sibilo omnes fugat serpentes.
nec flexu multiplici, ut reliquæ, corpus
impellit, sed celsus & erectus in medio
incedens, necat frutices: non contactos
modo, uerum & afflatos. exurit herbas.
rumpit saxa. talis uis malo est. Creditum
quondã ex equo occiso hasta, et per eam
subeũte ui, nõ equitẽ modo, sed equum
quoq; absumptũ. Huic tali monstro sæ-
pe etenim enectũ cõcupiũere reges ui-
dere, mustelarũ uirus exitio est. adeo na-
turæ nihil placuit esse sine pari. Inijciunt
eas cauernis facile cognitis sola tabe. ne-
cant illæ suo odore moriunturq; & natu-
ræ pugnam conficiũt. Basiliscum ex uo-
lucrum, quas Aegyptij uocāt ibes, ouis
gigni theologus Cassianus affirmat: uul-
gus ex ouo, quod gallus peperit, mōstro
se asserit nasci. qualis fuisse perhibetur is
qui Zuiccæ aliq̃t homines necauit suo
ueneno. qua de causa dominus cellæ in
qua erat, fores clausit muroq; sepsit.

Sequitur draco à uidendo appellatus, q̃
acrius cernat q̃ cæteræ serpētes. quocir-
ca ueteres eũ thesauris custodiendis præ-

fecerūt: atq; in ipsius custodia ædes, adyta, oracula posuerunt. Est autem ad aspectū pulcher, etenim totus niger, præter uentrem, qui subuירidis, & carnē submento, barbæ speciem præ se ferentem, quæ felle tincta uidetur esse. Pellis utriusque supercilij pinguis. Ipse præterea utrinque triplici dentium ordine decorus: nec tamen multum mordens. Pugnat in alijs regionibus cum aquila, in Africa & India cum elephante. Nam in his sunt uicenum cubitorū. Duplex eius genus: unum terrenum, quod iam descripsi: alterum uolucris, cui ut uespertilioni membranæ sunt alæ. Id ex uastitate Libyæ uento Africo inuehi in Aegyptum Cicero scriptum reliquit. Vnum habui longum sesquipedem, quo Ambrosium Fabianum donauī. cui ferè color crocodili fuit. de hoc scribit Lucanus:

Vos quoq; qui cunctis innoxia numina terris

Serpitis aurato nitidi fulgore dracones

Pestiferos ardens facit Africa, ducitis altum

Aera

Aera cum pennis, armentaꝫ tota se
quuti

Rumpitis ingentes amplexi uerbe-
re tauros,

Nec tutus spacio est elephas. datis
omnia letho.

Nec uobis opus est ad noxia fata ue-
neno.

Vt autem ex dictis serpentibus aliquæ
in calidissimis regionibus nullo anni tē-
pore necesse habent latere, certē in are-
nis & rimis saxorum solent cubare.

Serpit etiam teredo. caret enim non
modo pennis, uerum etiam pedibus. sed
ea cui color æneus sub lignis putribus et
nascitur & latet, ac plerunq; iuxta scolo-
pendram inueniūt. Crassitudo ipsi est mi-
nimæ pennæ anserinæ, qua utimur cum
scribimus: longitudo scolopendræ. sed
teres est. Hactenus de animantibus,
quæ in terra latēt aliquo anni tempore:
nunc dicam de subterraneis proprie ue-
reꝫ sic dictis, hoc est de his quæ intra ter-
ram gignuntur, & semper ferē sub terra,
quasi defossæ uiuūt. Hæ autem ipsæ par-
tim in terra sicca, partim in humida, uel

in aquis subterraneis uitam agunt. Primi generis sunt talpa, mus, rana uenenata, spondylis, ascarides, lumbrici, cochleæ cauaticæ: alterius, pisces subterranei. quas animâtes singulas persequar: & primo quidem talpam. Ea quadrupes est non multum dissimilis muri, cæca tamē. quāquam oculorum effigies, scribit Plinius, inest, si quis prætentam detrahat membranam, quæ non est pilis uestita. si quidò audit etiā obruta, extracta ex terra, quam in aruis, magis uerò in pratis & hortis, passim egerit, diu non potest uiuere. crura habet breuia, quare tarde graditur. digiti, qui in prioribus pedibus sunt quini, in posterioribus quaterni, omnes acutis unguiculis, quibus terram fodit, armantur. pilos autem habet nigrore splendido insignes. qui catulis earum sunt albi. Vescitur ranis, etiam uenenatis, lumbricis, radicibus frugum & herbarum. ex earum pellibus pileoli & cubicularia sunt stragula. Sequitur mus subterraneus, quem alij agrestem uocant. Seruius à Cicerone nitedulam putat nominari. De hoc Virgilius:

sæpe

sæpe exiguus mus
Sub terris posuitq; domos, atq; hor-
rea fecit,
Aut oculis capti fodere cubilia tal-
pæ,
Inuentusq; cauis bubo, & quæ pluri-
ma terræ
Monstra ferunt.

Non autem multo minor est mure ara-
neo. quin caudam ut ille longam habet
ac crassam. Corrodit, imò exest, planeq;
interdum consumit radices lupuli, pasti-
nacæ, rapæ, & reliquorum leguminum.
Vastat messes: uerum ea pestis non sem-
per in terra latet, sed nonnunquam egre-
ditur, etsi rarius. Contrà rana uenena-
ta, quam metallici nostri ex ignis colore
qui insidet ei, *πνεύρωσις*, suo tamen uo-
cabulo nominant, in saxis perpetuo qua-
si cōdita & sepulta latet. Altius intra ter-
ram gignitur, & reperit̃ modo in uenis,
fibris, saxorum commissuris, cum hæ ex-
cauātur: modo in saxis ita solidis, ut nul-
la foramina, quæ uideri possint, appare-
ant, cum cuneis diuidūtur. Quo sanè mo-
do & Snebergi & Mannisfeldi fuit in-

uenta. Ea ex subterraneis cauernis elata in lucem primò turget ac inflatur, mox de uita decedit, talis etiam rana crebrius reperitur in Gallijs Tolosæ in saxo arenario rubro, candidis maculis distincto, ex quo molæ fiunt. quocirca id genus saxa omnia priusquā molas ex eis faciant, perfringunt. quòd nī fecerint ranæ, ubi cum molæ uersantur, concaluerint, inflari solent, & disruptis molis frumenta ueneno inficere. Spondylis autem uermis intra terram reperiri solet ita conuolutus ut uerticilli, quod Græci *σπὸνδύλου* uocant, speciem præ se ferat: unde nomē inuenit. Ei longitudo & crassitudo minimi digiti: caput rubrum. sed quia hic uermis caret pedibus, & serpit, Plinius scribit: genus id serpentis est. edit radices cucumeris asinini, chamæleontis nigri, centaurij, peucedani, aristolochiæ, uitis syluestris: cum aliud animal eas non attingat. Sed uermis quadrupes, qui in Maio natus in agris currit, item crassus & longus minimum digitum, ut pulices terreni, in leguminibus orti, supra terram uiuit. Ei corpus molle, nigror splendidus.

gracilis

gracilis isthmus. posterior corporis pars pectori adheret. cum in manus sumitur, eas pingui liquore inficit. pellit urinam, sed unà sanguinem. Ascarides etiam, qui sunt uermes parui, nō unius & eiusdem coloris. nam alij candidi, alij lutei, alij nigri, sæpius aratro excitantur. Reperiuntur autem plures in unum aliquem locum congregati. hi uastāt sata. etenim ualidas segetes radicibus subsec̄tis enecant. At lumbricos, qui item intra terram gignuntur, & oculis carent, pluuiæ eliciunt. Concinne igitur Euclio Plautinus, sollicitus de aula auro referta, inquit ad Staphylum:

Foras, foras lumbrice, qui sub terra ereplisti modò,

Qui modò nusquā cōparebas, nunc quom compares peris.

Quin cochleæ in Balearibus insulis, ut Plinius scribit, cauaticæ appellatæ, non prorepunt è cauis terræ, neque herba uiuunt, sed uuæ modo inter se cohærent.

Abeo nunc ad alterum animantium subterranearum genus, quod in humidis terræ locis agit: etsi lumbrici etiā & aliæ

74 DE ANIMANTIBVS

aliæ quædam id genus animâtes in terra tantū gignuntur humida. Pîsces aut fos- files duorum generū inueniūtur, sed in- tra terram nonnihil teretes ut anguillæ, sed pelle carēt tenaci: squamis etiam, ut & gobi. duramq; nec admodum iucun- dam gustui habent carnē. maiores crassi sunt ferè duos digitos: minores, digitū. illi lōgi circiter palmos quatuor: hi tres. Sonum edunt acutum. Eos pharmaco- polæ in uîtrum inclusos de trabe suspen- dunt, ut spectaculum hominibus præbe- ant: longoq; tempore alunt pane & alijs quibusdam. Ex fluminibus autem quæ currunt in locis paludinosi egressi per riparum uenas longius penetrant in ter- ram: & interdum in proximi oppidi cel- las usq; subterraneas, in quibus uinum uel zythum solet condi. Attamen Theo- phrastus scribit eos reperiri iuxta fluui- os & in aquosis locis. Cum enim terram inundauerit aqua, ex alueis fluminum egredi in eam: cum decreuerit, relinqui in exiccata. Itaq; persequētes humorem terram subire: dein humore exiccato in halitu permanere: non aliter ac pîsces in
ter

ter cate
tem pro
hil sent
dillim
bus qu
non pr
in par
nullo
per for
lois se
mus se
cum se
non i
tum e
trare
quod
uim, c
uim
sedre
lybi
libre
plani
berit
bes
Cel
foss

ter cæteros salitos uiuunt. In latebris autem propter sensuum stuporem eos nihil sentire, sed effossos se mouere. Non dissimile ait accidere in Ponto his piscibus quos glaciés complectitur. Etenim non prius sentiunt & mouentur, quàm in patinam iniecti coquantur. Verum nullos pisces, qui in fluuijs uersari semper soliti fuerunt, post inundationes in locis siccis relictos subire terram uidemus, sed omnes de uita decedere. Itaque cum fossiles pisces etiam in locis, quos non inundauit aqua, soleant inueniri, certum est illos eò per uenas & fibras penetrare. De qua re ultra Albim Orteranti, quod oppidum est ad Polsenicium fluuium, diligenter aduerti. Nec in Germania modo fossiles pisces reperiri solent, sed etiam post Pyrenæos montes, ut Polybius in quarto & trigesimo historiarum libro tradit, usq; ad Narbonem amnem planicies est: per quam fluuij feruntur Iliberis & Rhoscinus fluentes propter urbes eiusdem nominis, quæ habitantur à Celtis. In hac igitur planicie sunt pisces fossiles dicti. In ea enim est terra tenuis &

& multum nascitur gramen. sub quod altitudine duorum uel trium cubitorum per arenam aqua fluminum dilatata fluit. Et si quando inundauerint cum aqua pisces terram subeuntes alimenti causa, nam mirifice appetunt graminis radices, planiciem efficiunt refertam piscibus subterraneis, quos incolæ effodiunt. Inueniuntur etiam fossiles pisces circa Heracleam, & in multis Ponti locis, ut Theophrastus memoriæ prodidit. Quin, si Senecæ credimus, sub terra sunt stagna obsessa tenebris & locis amplis. Animalia quoque illis innascuntur, sed tarda & informia, ut in aere cæco pinguique concepta, & in aquis torpentibus facta. Et, ut idem scribit, in Caria circa Idimum urbem cum exilisset unda, periere quicunque illos ederant pisces, quos ignoto ante eum diem cælo nouus amnis ostendit.

Postremo in subterranearum animantium, seu, quod placet theologis, substantiarum numero haberi possunt demones, qui in quibusdam uersantur fodinis. Eorum autem duplex est genus. Sunt enim truculenti & terribiles aspectu

Et tu, qui plerunque metallicis infesti atq;
inimici sunt. Talis fuit Annebergius il-
le, qui operarios duodecim amplius fla-
tu interfecit in specu, qui corona rosa-
cea appellatur. Flatum uerò emittebat
ex rictu. Equi enim specie habentis pro-
cerum collum & truces oculos dicitur
uisus. Eiusmodi etiam fuit Snebergius,
nigro cucullo uestitus, qui in fodina Ge-
orgiana operarium e solo sublatum in su-
periori loco maximæ illius concauitatis
quondam feracis argenti collocauit, non
sine corporis attritu. Certe Psellus, cum
sex genera dæmonum definiat numero,
hoc cæteris peius esse dicit: quòd ipsi a-
miçtui sit crassior materia. Quidam phi-
losophi hos & similes dæmones, qui no-
centes sunt, & natura improbi, nomi-
nant brutos & rationis expertes.

Sunt deinde mites, quos Germa-
norum alij, ut etiam Græci, uocant Co-
balos, quòd hominum sunt imitatores.
Nam quasi laticia gestientes ridet: &
multa uidentur facere, quum prorsus ni-
hil faciant. Alij nominant uirunculos
montanos, significantes staturam, qua
plerunq;

plerunque sunt: nempe Nani tres do-
drantes longi. Videntur autem esse se-
neciones & uestiti more metallicorum,
id est, uittato indusio, & corio circum
lumbos dependente induti. Hi dam-
num dare non solent metallicis, sed ua-
gantur in puteis & cuniculis: & quum
nihil agant, in omni laborum genere ui-
dentur se exercere. quasi modo fodiant
uenas, modo in uasa infundant id quod
effossum est: modo uersent machinam
tractoriam. Quanquam uerò interdum
glareis laceffunt operarios, rarissime ta-
men eos lædunt. Nec lædunt unquam,
nisi prius ipsi cachinno fuerint aut ma-
ledicto laceffiti. Itaque non admodum
dissimiles sunt dæmonibus, tum his qui
raro hominibus apparent, quū quotidie
partē laboris domi perficiant, & curent
iumenta. quibus quod nostri causa be-
nigne faciant, generiq; hominum sint,
aut saltem esse uidentur, amici, nomen
imposuerunt Germani. Gutelos enim
appellant: tū Trullis uocatis. quos sexu
tam mulieris q̃ uiri ementito cum apud
alias nationes, tum maxime apud Suio
nas

nas inf
nes mo
specul
iam, u
cane
fec

nas in famulatu fuisse ferunt. Sed demones montani potissimum laborāt in his specubus, è quibus metalla effodiuntur iam, uel ea effodi posse spes est. Quocirca metallici non deterrētur à laboribus, sed omen inde capientes alacriori animo sunt, & uehementius laborant.

ANIMANTIVM DE QVIBVS
scribimus nomina, quæ ipsis po
suerunt Germani.

GRADIENTIVM

Alce elch/ elend

Aper Wildschwein

Asellus schefflein. in fenestris uer
satur.

Βατραχίδες Faulkroten

Blattæ Wibel/ brotworme/ spring
wibel

Βρίξας laubfrosch

Καλαμίτη item laubfrosch

Καμψίον eichorn

Caprea reh

Cervus hirs

Chamaeleō Germanis est ignotus

Crocodilus crocodil

Cuniculus cunlein

Dama eingemps des horner vorsich
gebogen sein

Ελας eichorn

Ert

NOMINA

Erinaceus igel. eius duo genera,
huntsigel vnd sewigel

Fiber piber

Formica eims

Γαλήν Wisel

Glis eichorn

Glis Fennicus feh/dar von fechberg
vnd schonberg

Γυρίνοι Kaulkroten

Histrix stachel schwein/porcopick

Ibex steinpock

Ιχτίς iltes

Lacerta grunadex

Lacerta Chalcidica Kupferadex

Lacerta aquatilis Wasseradex

Lupus Wolff

Lupus ceruarius lups

Lutra otter

Martes steinmarter/vnd paummar-
ter

Meles days

f

Melium

ANIMANTIVM

Melium ein halsband dar vñ 8 days
gefuttert / so man den hunden
anlegt

Μολυρπίδες Paulkroten

Musalpinus murmelthier

Mus araneus ratte

Mus lassicius lassitz

Mus Noricus pile

Mus Pannonicus

Mus Ponticus hermlein

Mus aquaticus Wassermaus

Mus subterraneus schörmans

Mus sylvestris haselmaus

Mustela domestica Wisel

Mustela sylvestris iltes

Μυγάλη ratte

Μῦς σκίουρος eichorn

Noerza noerz

Platyceros damhirs

Pulices terreni erdfloh

Πυρίπρως feürkrote

Rana

Rana

Rana

Rana

Rana

Rana

Rup

Salam

Scor

Su

Sore

Stelli

Talpe

Tax

Te

Tra

Ver

Vit

Vo

NOMINA

Rana rubeta Krote

Rana temporaria reinfroschlein

Rana uenenata fossilis feürKrote

Rana uiridis parua laubfrosch

Ranæ uirides, subliuidæ, subcine-
reæ frosche

Rupicapra ein gemps des horner
hinderzich gebogen sein

Salamandra molch

Scarabeus, de quo hic loquimur,
sewKefer

Σχιουρ ♂ eichorn

Sorex spitzmaus/feltmaus

Stellio Tarantula

Talpa molwurff

Tarandus reen

Testudo schiltKrote

Tragelaphus brandhirse

Vermis in Maio natus meiworm

Viueria furette vnd hamster

Vormela Wormlein

f 2

Vrsus

ANIMANTIVM

Vrfus beer

Vulpes fuchs

Zobela zobel

VOLANTIVM

Alauda lerch

Anas immanfueta Wilde ente

Anser immanfuetus Wilde gans

Àpis pien

Αποδ' es spirschwalben

Aquila adler

Ardeola reicher

Attagen haselhin

Bubo grossuhu

Ciconia storch

Cornix Frahe

Coruus aquaticus Wasserrabe

Coruus, cuius caput rubra macula est inſigne holſtahe

Coruus nocturnus nachtrabe

Crabro hozlige

Cuculus

NOMINA

Cuculus Kuckuck

Kύτταγ spirschwalben

Fulica Wasserhuhn

Galgulus hemmerling

Gryllus domesticus hausheim

Gryllus agrestis feldheim

Halcyon fluuiatilis eisvogel

Hirūdines domesticæ hausschwal

ben agrestes maurschwal

ben ripariæ spirschwalben

Ibis auis Ægyptia Germanis igno
ta

Ιατρυ hemmerling

Locusta heuschrecke

Mergus teucher

Merula amissel vnd schamissel

Miluus Wei ader hunerath

Noctua schlaerule/stockeule/steineule

Νυκτιγόαξ nachtrabe

Olor schwan

Onocrotalus schnegans

f 3

Palum

ANIMANTIVM

Palumbes holztaube vnd ringels
taube

Perdix rāphun

Pica agelester

Picus specht

Πυρρονόραξ holkrahe

Querquedula Erichentlein

Sturnus stār

Tetraones pirczhuner vnd auerhān

Turdus Krametvogel/ zimer/ Wein
drusschel/zipdrusschel

Vespa Wespe

Vespertilio fledermaus

Vlula huhu

Vpupa Wichehopfe

Vultur hasengeir

NATANTIVM

Alburnus Weisfisch

Asellus, in Italia Asino

Aurata, Venetijs Auraia

Barbus

Barbus
Buccin
Canc
Cong
Corac
Delp
Efor
Glauc
Gobi
Hipp
Luci
Meru
Mure
Orph
Pisc

Pect
Perc
Prin
Pur

NOMINA

Barbus parme

Buccinum, in Liguria corneto

Cancer fluuiatilis Krebs

Conger, in Italia congro

Coracinus, Neapoli coracino

Delphinus mehrschwein / dar von
Kompt salspect

Esox lays

Glaucus

Gobio fluuiatilis schmerle

Hippurus

Lucius hecht

Merula, Mafsiliæ roquando

Murena, in Italia murena

Orphus, in Sicilia cernha

Pisces fossiles peister vnd merput-
ten / qui sunt crassiores

Pecten, Venetijs cappe

Perca berse

Primadia

Purpura, in Græcia porphyro

f 4

Raia

ANIMANTIVM

Raia roch
 Salar fhure
 Salmo salm
 Sturio stōr
 Thynnus thunno
 Turdus, Mafsiliæ roquando

SERPENTIVM

Acontias, ignotus Germanis
 Amphisbæna, ignota
 Aspis, ignota
 Boa vnke
 Basiliscus, ignotus
 Cæcula blindschliche
 Calabricus serpens, ignotus
 Χέρον & natter
 Cenchris, ignota
 Cerastes hornichte schlange
 Dipsas, ignota
 Draco drach
 Dryinos eichschlange

Hæmor

Hæm
 Nat
 Por
 Scy
 Sep
 Tve
 Tve
 Vip
 Yof
 Al
 Lu
 Spo
 Te
 D

NOMINA

Hæmorrhous, ignotus
 Natrix natter
 Porphyryus, ignotus
 Scytale, ignota
 Sepedon, ignota
 Τυφλίη blindschleiche
 Τυφλὴ blindschleiche
 Vipera, Italis marasso
 Υδρὸ natter

VERMIVM

Ascarides erdworm
 Lumbricus reinworm
 Spondylis engerle
 Teredo Pufferworm

DAEMONVM

Dæmon subterraneus truculentus
 bergteufel mitis bergmen-
 nel/Kobel/guttel

f 5

INDEX IN LI-

BRVM PRÆCEDENTEM

A

A Contias	65.66
Aelianus	4.65
Aenariæ coloni terræ motu & calidarū	
aquarū effusionib. sedibus exacti	10
Αἰανόχοιρος, qui & histrix	43
Alaudæ 16 hyeme latent in cauernis	
montium	53
Albertus Magnus	11
Alce	24
Ambrosius Fabianus	68
Amphisbæna	60
Anates immanisuetæ	14
Animal incognitum repertum in Nori-	
co	11
Animantes subterraneæ quæ proprie &	
sint & dicantur 9.69 quæ in terra sic	
ca 70 quæ in humida agant	73.74
Animantium subterranearum tria gene-	
ra	16
Animantes omnes natura mutationem	
sentire	9
	Ani

INDEX

Animantes quæ in regionē ē qua egres-
sæ sunt non reuertuntur 9.10.11 quæ
reuertuntur 12.13

Animantes frigoris aut caloris uitandi
causa locum mutantes 12.13

Animantes quæ noctu uel interdiu in ca-
uernis terræ delitescunt 16.17.18. &
deinceps

Animantes quæ in terra latēt aliquo an-
ni tempore 30.31.32. & deinceps usq̃
ad pag. 70

Anseres immanis ueti 14

Aper 24

Apes 15

Αποδες, quæ & κυψελαι 52

Aquatilia quæ aliqua anni parte se in cœ-
no uel arena condunt 53

Aquila Northusæ mortua 11.12

Aquila à Ianio Dincelspyheleni occi-
sa 12

Aranei nigri 51

Aratus 57

Ardeola 14.26.33.47

Aristoteles 4.8.49.64

Aristophanes 28

Arces

INDEX

Arces subterraneæ	18
Ascalabus, & ἀσκαλαβώτης, qui & stel- lio	49
Ascarides	70.73
Aselli rimis parietum occultantur	15
Asellus piscis æstiuus mensibus se con- dit	53
Asio noctuæ species	28
Aspis, & eius genera	62.63
Attagenes	14
Aues hyeme in cauis arboribus laten- tes	15.16
Aues luteæ	8
Aues quædam cur uerno tempore con- spiciantur implumes	16
Aues nocturnæ	27
Aurata æstiuus mensibus se condit	53

B

B asiliscus	66.67
βασιλίσκος	57
Blattæ parietum rimis occultantur	15
Boæ ex natricum genere	62
βρεφας, rana	56
Bubo	27.53
Buccina	53
Bufo	

Bufo

C

Capr

Calli

Kas

Cast

Cau

Cau

Cac

Cel

Cer

Cer

Cep

Cer

Cer

Cer

Cer

Cer

Xa

Che

Che

Cic

Cir

Cle

INDEX

Bufo 57

C

C Ancer fluuiatilis 58

C Calabricus serpens 61

Caprea 24

Cassianus theologus 67

Κάσσιος 24

Castorea 24

Caucasus mons 17

Causon quæ & dipfas 60

Cæcula hyeme se condit in terra 60

Cellæ subterraneæ 12

Cenchrus serpens 66

Centipeda quæ & scolopendra 51

Cephi Aethiopici 11

Cerastes 64

Cervus 24

Ciconiæ 14

Chamæleon 46.47 aura alitur 49

Χαμαιτυπῆα 19

Chelydros 64

Chersydros 61

Cicero 68.70

Circe 18

Cleopatra aspidas ptyadas sibi admouit

63

Colu

INDEX

Columella	60
Cœnobium subterraneū in Sedunis	18
Corpus subterraneum & eius diuīſio	7
Coruus aquaticus	14
Coruus qui $\omega\nu\beta\beta\omicron\nu\sigma\rho\alpha\epsilon$	16
Coruus piscis hybernīs mensibus se con-	
dit	53
Conger	53
Cochleæ	53
Cochleæ cauaticæ	70.73
Colubri Thebani cornuti	64
Crabrones syluestres	15
Crocodilus 53.54 ad insulam Tenty-	
ritarum non adnata	55
Cuculus	16
Cuniculus	20
Cymbri	10

Vide etiam in Kappa.

D

D Ama	24
Dantīſci bona pars uulgi sub terra	
habitat	20
Dæmones subterranei, & eorū duplex	
genus	76.77.78
Delphīnus	53
Delphi	

INDEX

Delphinus hostis crocodili	55
Dioscorides	3
Dipsas	59
Domus in Armenia maiori quales	17
Draco 67 cum aquila & elephante pu gnat	68
Dryinos	63

E

E λεός Aristoteli glis dictus	33
Erinaceus hyeme in cauis arborib. se condit	15.22.30
Esox	14
Εχιδνα	58

F

F iber, & eius descriptio	22.23.24
Fibri pelles & testes	24
Formicæ	15
Fossæ Prenestinae	19
Fulica	14
Fuluus Hirpinus uiuaria gliribus insti- tuit	35

G

G algulus	13
Γαλιώτης, qui & stellio	49
Galenus	63
Γάλα	

INDEX

γάλα, quæ uifela	37
Ganeum	19
Glaucus piscis hybernis mēſibus ſe con-	
dit	53
Glis	15.32.33.34
Glis Fennicus	33.34
Gliraria	34
Gothi ex Scandia in Sarmatiam & Da-	
ciam	10
Grues ab ultimis quaſi terris in ultimas	
diſcedunt	14
Grylli domeſtici, agreſtes	51
γύεινοι	57

H

H Alcyones marinæ, fluuiatiles	26
Hameſter qui à quibuſdam crice-	
tus	41
Hameſtri appellatio in hominem uora-	
cem apud Germanos	42
Hæmorrhœos	64.65
Hippurus piſcis	53
Hirundines hyeme in loca tepidiora ſe-	
cedunt	53
Hirundines ripariæ, quæ & ἀποδιδέ &	
κύνελοι	52
Histris	

INDEX

Histris hybernis mensibus in specus se-	
cedit	43
Histris descriptio	43
Hoensteinum	19
Homerus	18
Homines cauernas succedentes, qui ex	
eo Troglodytæ	17.29
Homines syluestres Scricfinniæ	17
Hydros	61.64

I

I Aculus serpens	65.66
Ibex	24
Ibis Aegyptia 67 in Alpibus uisa	11
Ichneumon crocodilo inimicus 54 aspi-	
di	63
ἰκτὸρ Ⓞ	13
ἰκτὶς mustelæ genus	38.63
ἰκτὶ Ⓞ pellis, prouerbiū apud Germa-	
nos in uilissimū & maxime foetidum	
scortum	38.39

K

K Αλαμίτη rana	56
καμψίς Ⓞ, Latinis glis	33
κιχθαῖν, sonus quem ululæ edunt	28
κόβαλοι, daemones hominum imitato-	
res	

INDEX

res	77
κύνελοι, quæ & ἄποδες	52
L	
L Acerta Chalcidica quæ & seps	46
L Lacerta hybernis mensibus in terra latet	45
Lacerta à stellione quomodo differat	49
Lacerta aquatilis	46.53
Lacerta uiridis	28
Lagopus	26
Lepus	24
Locustæ in Pannonias, Daciam & Lygi os proximis annis inuolarunt	11
Lubeci bona pars uulgi sub terra habi- tat	20
Lucanus 66.68 reprehensus	61
Lumbrici	70.73
Lupus	24
Lupus ceruarius	24
Lurida, auis	13
Lutra, & eius descriptio	20.22.23
M	
M Artialis	34.39
M Meles 20.21.24.25	caninus fuit

INDEX

fuillus	25
Melia	26
Mergus	14
Merulæ	16.53
Merula piscis	53
μόλυη Græco nomine Germanis, quæ salamandra	50
μολύειδω ranæ	57
Mus Alpinus	30.31.32.33
Mus araneus, qui & μυγάλη	36.37.71
Mus aquatilis	58
Mus sylvestris	36
Mus Lascicius	35
Mus Noricus, qui citellus	35
Mus Ponticus	15.35
Mus Pannonicus	36
μὺς σκίεω	33
Mus subterraneus, qui & agrestis	70.71
Multipeda & milipeda, quæ & scolopendra	51
Murena hybernis mensibus se cōdit	53
Mustela quæ proprie γάλη 37 quæ ἰκπς 38 quæ martes 39 quæ Germanis zobela	40
Mustelarum uirus basilisco exitio	67
g 2 Natrix	

INDEX

N

N atrix hyeme in caua terræ ingre-	
ditur 61 eius genera	61.62
Nicāder	49.57.60.64.66 reprehēsus 59
Nitedula	70
Noerza	40
Noctua	27.28.53
Noctuarum genera	28
Nycticorax	27.28

O

O lores	14
Onocrotalus	14
Opianus	4
Orphus piscis hybernis mēsis se con-	
dit	53
Ouidius	30
Oua serpentium in ignem cōiecta flam-	
mam restinguere	50

P

P Alumbes	16.53
Pecten	53
Perca	53
Perdix	14
Perfarum reges hyberno tēpore Baby-	
lone, uerno Susis, æstiuo in Ecbatanis	
dege	

INDEX

degebant	13
ῥυειφρω	71
φρω, rana rubeta	57
Picus	16
Pisces uitandi caloris & frigoris gratia	
mutant locum	14.15
Pisces fossiles	75.76
Platyceros	24
Plinius 4.11.25.35.52.62.63.64.66.70	
72.73 reprehensus	56.57.59
Polybius	48.75
Porphyrus	4
Porphyrus serpens	65
Prester à dipsade differt	60
Prenestinae fossæ	19
Primadia	53
Psellus	77
Psyllorum olfactu serpentes fugant	55
Pufhardum	18
Purpura	53
ῥυειφροι, bestiolæ	8

Q Verquedula ^Q 14

g 3 Raia

INDEX

R

R Aia	53
Ranarum diuersa genera	56.57
Rana rubeta	57.58
Rana quæ καλαμίτης	56
Ranæ temporariæ	56
Rana uenenata	70.71.72
Renum doloris medicamentum	25
Reinesteinum	18
Rupicapra	24

S

S Al inimicum lacertæ aquatili	46
Salamandra, quæ Germanis Græco nomine μόλγκ	50.51
Salmo	14
Scandia	10.17
Scarabei rutili	51
Scolopendra	43.51
Scricfinniæ syluestres homines	17
Scytale	60
Σκίρ	33
Seneca	76
Sepedon	65
Seps seu lacerta Chalcidica	46
Serpentes hyeme latentes	58.59
Serpens	

INDEX

Serpens Calabricus	61.62
Seruius	70
Sorex	36
Spondylis uermis	70.72
Stellio	49
Sturio	14
Sturni	16.53
Subterraneum corpus, & eius diuifio	7
Sibyllæ Cumææ antrum	17

T

TAlpa	70
Tarandus	24
Tenedi insulæ piscatores rupium specu bus pro domibus utuntur	17
Tentyritæ	55
Teredo	69
Terrarum quasdam oras onera, qui- bus premuntur in alias sæpe depone- re	10
Tetraones	14
Teutones	10
Thebani colubri	64
Theophrastus 3.6.74.76 reprehē- sus de piscibus subterraneis	75
Testudo terrestris	51

g

Thynnus

INDEX

Thynnus	14.53
Tragelaphus	24
Troglodytæ	17.29
Trochilos crocodilo dentes & fauces re purgat	54
Trulli dæmones	78
Turdi	16.53
Turdus piscis	53
Turtures hyeme in cauernis montium latent	16.53
Τυφλῖν & Τυφλῶν	60
V	
VArro	25.28.34
Vermis quadrupes in Maio na- tus	54
Vespertilio	27.28.29.53
Vespæ	15
Vipera quæ ἐχιδνα	58.59
Virgilius	61.70.71
Visela quæ γάλα	37
Viueria	25.41
Vlula	27.53
Volucres quæ hyeme se condunt in ter- ra	52
Vormela	42
Vpupæ	

INDEX

Vpupæ	16.53
Vrsus	44.45
Vulpes	20.21.22
Vultur	14

X

X Enophon	17
-----------	----

Z

Z Obelamustelæ species	40
------------------------	----

DE ANIMANTIBVS SVBTERRA-
NEIS INDICIS FINIS

CASTIGATIONES LIBRORVM

De ortu & causis subterraneorum

Pag. 10. vers. 4. quibus, non quas 11. 17.
efficiūt 34. foderint 40. trāsiret 13. 25
circumstetit, non circumserpit 14. 40.
qui aquis calidis scaturiūt 18. 27. Elbo
ga 30. 22. differpunt, non discerpunt
48. 34. lapides enim plerosq; omnes ui-
demus bene compactos & coagmenta-
tos solidosq; 54. 36. oritur 61. 23. ami-
antum 65. 31. amianto 39. amiantus
66. 4. amiārus 8. amiantū 70. 29. Mau-
ritanus 74. 33 nituntur.

Castigationes quatuor librorum De na-
tura eorum quæ effluunt ex terra.

86. 32. Strato Lampfacenus 87. 16. uo-
litent 89. 8. persequunt 36. octingēta
99. 9 sub Desteromonte 14. Vicelebio-
rum 101. 5. acidulæ 102. 19. in Sicilia
Palicorum fons 113. 16. chiragræ 30. ni-
mis frigidæ 114. 24. colicis 117. 9. la-
custris 119. 9. Iusgū, nō Cescū 120. 27
Cassinitū 122. 32. Salone, nō Sulmone
127. 31. quæ ad meridiem 128. 22. Don-
dorfi

dorfi 35. fontem Palicorum in Sicilia
135. 18. Appia, nō Appiana 19. Cimina,
non Cumina 136. 35. tēperet 141. 37.
nimis autem frigida 144. 32. & aquae
instar, non & tanq̃ aquae instar 149. 23
plethrum, nō iugerū 150. 26. per quen-
dam quasi cuniculum cæcū: aut in altum
per quendam quasi puteū cecum. uterq̃
autem, &c. 154. 31. Fesulanos 155. 35.
quoad caruerit 162. 35. Bithyniæ 163.
25. Hirsepergenes 30. Vetulonios.

Castigationes decem librorum De
natura fossilium

174. 32. nauseam 183. 27. possunt. 190.
33. aquis mollitæ, uel manu subactæ
200. 26. etenim dicit eam, non etiam
203. 37. in modico 212. 29. in terra reper-
tum aut cæditur 30. id, nō is 216. 5. quo
uitrum uitro iungitur 217. 33. refertum
non repertū 223. 37. Suditorū 234. 6.
circumdat 254. 37. illinēdi 256. 34. 36.
illinendi 257. 22. Desteri 264. 8. nitro,
non intro 267. 22. Motescha 268. 24.
callimus 287. 12. unde eadem, nō unde
& eadem 289. 2. genus, non pellucens
24. sma

2. smaragdi 292.27. separatur 301.34
petraro autem talis est 305.19. & pumi-
cosa, non est ^{qu}icosa 341.30. & colo-
ris. & omittit ^m 345.35. quem Gre-
canicam uocant 17. xris uero decē, non
uiginti 361.18. quē habent 374.36. illa
complectitur uel argentū, uel argētum
uiuum: hæc, &c.

Castigationes librorum De uete-
ribus & nouis metallis

387.15. exponenda 388.20. & ut ait En-
nius 402.28. annis 403.37. nō unum
abundat 405.12. autem 406.1. tractus
Vispani 409.21. μεταχάλου 34. Torin-
giam

Castigationes Bermanni

426.2. Pleinadum 430.7. interea nihil,
desideramus 432.18. ducentorū ferme
passuum, non orgyarum 21. quingentos
passus alti, non orgyas 439.28. adiudi-
candum 444.19. ne quid inflammatis.

FINIS

ēpi

BASILEAE APVD FR. BENIVM
ET EPICOPIVM MENSE AV-
GVSTO M. D. XLIX.

